

1788. *APARGIA autumnalis* Hoffm. — Ap. scapo ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentato-pinnatifidis glabriusculis. Sm. (Sp. 8. Gall. *Apargie d'automne.*)

Hall. Helv. 28. *Scorzonera* Enum. 758. n. 4. Sut. Fl. Helv. 2. p. 134. Heg. 2. p. 164. Clairv. Man. 236. Mur. Bot. Val. 52. Wahlenb. Helv. 138. *Hieracium Chondrillae folio glabro radice Succisae maius et minus* C. B. Basil. 38.

Willd. Sp. Pl. 3. p. 1550. Hoffm. Germ. I. p. 274. Bert. Amoen. It. 400. *Leontodon autumnale* L. Sp. Pl. 1123. Poir. Enc. Suppl. 3. p. 452. Dec. Fl. Fr. 2968. *Hedypnois autumnalis* Vill. Delph. 3. pag. 77. Smith Brit. 826.

Engl. Bot. 12. tab. 830. Schkuhr Handb. tab. 220. — Fuchs Hist. 820. Dod. Pempt. 639. fig. 4 et 5. I. B. Hist. 2. p. 1031. Dalech. Hist. 561. fig. 1. et 562. fig. 2. Tab. Kräuterb. 491. fig. 3 et 4. et 492. fig. 1.

β *alpina*, scapo unifloro apice insigniter incrassato, foliis dentatis v. pinnatifido-dentatis, calyce hirsuto. Schl. exs. cat. 1821. (Cf. *Leontodon pyrenaicum* Gouan Illustr. 55. tab. 25. fig. 1 et 2. An *L. pyrenaicum* Sut. Fl. Helv. 2. p. 135.)

Radix truncata, fibris albidis, numerosis stipata. Folia radicalia longa, angusta, plerumque glabra, subinde integriuscula v. varie dentata, saepius tamen pinnatifida, laciniis integris dentatisve, oblongis, peracutis. Caulis semipedalis, sesquipedalis, glaber, subangulosus, brachiatus, nudiusculus, rarius inferne foliolosus, ramis longiusculis, irregulariter subcorymbosis. Pedunculi squamosi, infra florem plus minus incrassati fistulosique, squamis s. bracteis linearibus peracutis instructi. Flores non magni, lutei, calyce glabro v. hirsuto, imbricato, phyllis linearibus, adpressis, lividis, apice nigricantibus. Flosculi extus rubelli. Semina gracilia, apice attenuata. (D. v.)

Hab. in pratis pascuisque, vulgo. β in Alpium locis humidis paludosisve. Im Calveiserthal supra Sargans et (caule sub-

