

Hieracium (variegatum) caule subnudo ramoso villoso, foliis radicalibus oblongo-spathulatis dentatis, caulinis rarissimis parvis sinuato-pinnatifidis, calyce eleganter variegato. *Lamark. encycl. 2. p. 359.**

Buntkelchiges Pfaffenrörlein. W.

Habitat in Monte Video.

Folia radicalia tripollicaria pollicem fere lata oblongo-spathulata, margine et inferne ad venas villosa. Caulis 6-f. 8-pollicaris striatus ramosus subnudus basi villosus, ramis unifloris. In quolibet ramo est folium parvum sessile pinnatifidum vel profunde dentatum. Squamae nonnullae linearis-subulatae sparsae infra calycem. Flores magni flavi. Calyx imbricatus, squamis oblongo-spathulatis disco et apice nudis fuscis, margine albis tomentosis. Pappus sessilis, ut videtur plumosus. *Lamarek l. c.*

* 17. APARGIA hieracioides. W.

A. caule ramoso hirto, foliis oblongo-lanceolatis dentatis hirtis, pilis furcatis. W.

Habichtskrautartiges Pfaffenrörlein. W.

Habitat in Galatia. (v. s.)

Planta facie *Hieracii murorum*. Caulis erectus apice ramosus hirtus. Folia sessilia sesquipollicaria oblongo-lanceolata dentata hirta. Pedunculi squamosi hirti. Pappus sessilis plumosus. Receptaculum nudum. W.

1409. T H R I N C I A.

Roth. catalect. bot. 1. p. 97.

Recept. favosum. Pappus difformis; marginalis membrana multifida; centralis stipitatus plumosus. Cal. octangularis octophyllus.

I. THRINCIA hirta.

T. scapo unifloro, calyce glabriusculo basi squamuulis aucto, foliis lanceolatis sinuato-dentatis, pilis simplicibus. W.

T. (*hirta*) radice fasciculata perenni, calycibus basi subimbricatis, seminum pappo substipitato. *Roth. catalect. bot. 1. p. 98.*