

quarta parte apice denticulatis, cuspide seminis quartam partem subaequante: omnibus partibus multo minoribus.

452. *L. lividus*. Pl. rar. Hung. II. t. 115.

453. *Apargia aurantiaca*.

Radix perennis, primaria obliqua, nigricans, pennam au-serinam crassitie subaequans, senescendo praemorsa evadens, radiculas filiformes albidas demittens, plerisque tantum unicum foliorum fasciculum edens. Folia radicalia quaterna — octona, 2—4-uncialia, lanceolato-oblonga, versus basin in petiolum angustata, obtusiuscula, remote repando-dentata, glabra. Scapus tantum non semper solitarius, erectus, semi-pedalis aut spithameus, nec raro altior, simplicissimus, strictus, striatus, glaber, sub flore incrassatus, hirtus, nigricans, ibidemque duabus foliolis linearibus hirtis instructus, caeterum aphyllus. Flos magnitudine *A. hispidae*, erectus. Calyx nigricans: squamis linearibus, obtusis, pilis nigricantibus rigidiusculis, hispidis, margine albidis. Corolla aurantiaca: tubulis albidis; ligulis striatis, apice truncaleo-5-dentatis, calyce fere longioribus. Filamenta albida, capillacea, tubulo inserta. Antherae flavae, exsiccatione expallescentes. Germen oblongum, album, glabrum. Stylus aurantiacus, filiformis, apice bifidus in stigmata subrevoluta. Pappus sessilis, plumosus, albus, demum calyce longior. Receptaculum nudum. Ex itinere Marmarosiensi secundo retali plantam similem, sed scapo ad medium tantum glabro, inde successive magis magisque pubescente superne hirto, foliis remote denticulatis, ciliatis, utrinque subhispidis. An haec non docent, *A. aurantiacam* et *croceam* per varietates intermedias coniungi? Quaerit etiam Schultes: an non potius ad *L. croceum* Haenke pertinet? Habitat in alpibus marmarosie-nibus Transylvaniae vicinis, et in finitimis hujus provinciae. Fl. Aug. et Sept.

longitudinem setalis raris brevibus albis adspersi, infra caly-
cem incrassati. Calyx ovato-cylindraceus, pilis albis lon-
gibusculis indivisis hispidus, sulcato-angulatus: squamis cari-
natis, linearibus, exterioribus triplo longioribus, acutiscaulis,
apice nigricantibus. Corollae et genitalia flava, seminaque
cum pappo et receptaculo ut in aliis speciebus. Similis *A. dubiae*, sed folia sinuata: lacinias remotis lanceolatis; scapi
aphylli, setis sparsis hispiduli, calyx oblongus, setis longio-
ribus hispidus. Habitat in rupibus subalpinis Croatiae.

460. *A. incana*.

Habitat in collibus et montibus locis aprieis siccis, quin
et in alpibus et subalpinis e. c. in monte Merszin ad Kore-
nicam, in alpibus Plissivica et Velebich (ubi pumila vix 4
pollicibus altior occurrit); in rupibus calc. legit Mauksch,
loco simili vidimus natam in valle Vilena draga prope Kore-
nicam, in Malenica monte legit Rochel, in montibus ad B.
Füred hortulanus. Saepius tota planta incana, etiam calyx
pilis admodum brevibus, apice stellatim divisus, alias scapi
apice et calyx basi pubescentis pilis sen setis longioribus in-
termixtis. — α . Foliis repando-dentatis, scapoque minus densis
pilis canescens, calycibus hispidis. Budae lecta in mon-
tibus aprieis. — β . Foliis obtusis, integerrimis, mollis a pilis
densissimis brevibus multifidis incanis. Calyce nigrescente, a
pilis longioribus canescente; corolla calycem parum excedente.
Scapus raro spithamam aequans. Folia sesqui- aut bipolli-
caria. Habitat in alpibus Scopusii rara. An distincta species
sit cultura tentandum. — γ . Foliis sinuatis: dentibus patentissi-
mis. In silvis praedii Eszeny ad Isztinér ab Horki lecta.

461. *A. obtusa* mihi.

Radix primaria, recta, brevis, basi in radiculas vix pol-
licis longitudine divisa, fusca. Scapus subpedalis, sulcato-
striatus, glaber, aut omnino nudus aut foliolo subulato supra

medium instructus, sub calyce non incrassatus. Calyx glaber. Cetera floris, ut in plerisque. Folia obverse lanceolata, obtusa, remote, grosse dentata vel crenata: dentibus obtusis, his apiceque raro denticulo brevissimo obtuso mucronatis, utrinque plus minus hispida, setis seu pilis longiusculis, simplicibus. Ubi legerim non memini.

462. *A. autumnalis.*

Magnitudine, foliorum forma, tegmine valde variat: in subsalsis ad Arok-Szallás, Aszaló etc. palmaris, glabra, calycibus subpubescentibus; alibi in pratis communiter spithamea aut paulo altior, tota glabra; in vallis umbrosis pedalis aut subpedalis foliis laciniatis. Folia alia sinuato-dentata: dentibus obtusis; alia profundissime pinnatifida: dentibus linearibus acutis longis; alia forma intermedia; sunt omnino glabra, in aliis subhispida. Lumitzer pro *Leontod. Hedyponoide* proposuit.

463. *A. crispa.*

In asperis, rupestribus ad Korenicam in Vilena Drága, occurrit scapis pluribus (4 — 6), spithama brevioribus. Pili foliorum plerique quidem apice trifidi, sed etiam quadrifidi et multifidi. Scapi pilis bi-trifurcatis adspersi. Calyx et summa pars scapi pilis longioribus simplicibus obsita. Similiter se habet specimen a Balbisio pro *A. Villarsii* missum.

464. *A. hispida.*

Etiam haec non parum variat: α) In Merszin lecta scapis erat ceterum glabris, sub calyce nonnihil incrassatis hirtis, pilis simplicibus, bi-trifurcatis, multifidisque: foliis sinuatis dentibus apiceque obtusiusculis, canescensibus, pilis bifurcatis, paucissimis trifurcatis. — β: In alpibus Zoliensibus et Liptoviensibus follis fuit supra glabriusculis, subtus subhispidis: pilis simplicibus, quibusdam apice bifidis; scapis glabriusculis,