

2. P. PURPUREA: calyc. 5-floris, foliis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus denticulatis, subius glaucis. *W. Sp.*

*Hab. in Europ. austr., German. 24. D.*

3. P. HIERACIFOLIA: foliis radicalibus runcinatis, caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis, panicula corymbosa divaricata nuda. *W. Sp.*

*Hab. in Eur. austr. 24. D.*

### 912. LEONTODON.

1. L. TARAXACUM: calyce exteriore reflexo, foliis runcinatis glabris: laciinis lanceolatis dentatis. *W. Sp.*

*Hab. in Europ. 24. D. — β. nigricans.*

2. L. SEROTINUS: calyce exteriore patulo, foliis runcinatis scabris: laciinis rotundatis denticulatis. *W. Sp.*

*Hab. in Hungar., Taur. 24. D. intr. 1803.*

3. L. LIVIDUS: calyce exteriore erecto adpresso: squamis ovatis, foliis lanceolatis sinuato-dentatis glabriusculis. *W. Sp.*

*Hab. in Europ. 24. D. intr. 1801.*

4. L. OBOVATUS: calyce exteriore patulo: squamis ovatis, fol. obovatis obtusiusculis dentatis. *W. Sp.*

*Hab. in Hispan. 24. F. intr. 1807.*

### 913. APARGIA.

1. A. HASTILIS: scapo 1-floro nudo calyceque glabro, foliis lanceolatis runcinato-dentatis glabris. *W. Sp.*

*Hab. in Europ. austr. 24. D.*

2. A. DUBIA: scapo 1-floro superne calyceque hirto, foliis lanceolatis basi dentatis pilosiusculis, pilis furcatis. *W. Sp.*

*Hab. in alpib. Salisburg. 24. D. intr. 1806.*

3. A. TUBEROSA: scapo 1-floro nudo glabriuscule, calycinis squamis acutis hirtis, foliis obovato-

runcinatis hirtis scabris, pilis furcatis, radice tuberosa. *W. Sp.*

*Hab. in Ital., Gall. austr. 24. F. intr. 1805.*

4. A. INCANA: scapo 1-floro subnudo calyceque pubescente, foliis lanceolatis acutis subdenticulatis cano-scabris, pilis multifidis. *W. Sp.*

*Hab. in Germ., Gall., Helvet. 24. D. intr. 1805.*

5. A. AUTUMNALIS: scapis ramosis declinatis squamosis, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis glabriusculis. *W. Sp.*

*Hab. in prat. Eur. 24. D.*

6. A. PRATENSIS: scapo ramoso, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis: laciniis linearibus, calyce tomentoso hirto.

*Hab. — — ○. D. intr. 1813. ex horto halens.*

*Affin. A. autumnali.*

7. A. CRISPA: scapo nudo 1-floro calyceque hirto, foliis runcinato-pinnatifidis hirtis: laciniis recurvis dentatis, pilis trifurcatis. *W. Sp.*

*Hab. in Gall., Helvet. 24. F. intr. 1804.*

8. A. HISPIDA: scapo nudo 1-floro, calyce hirto, foliis runcinato-dentatis hirtis, pilis furcatis. *W. Sp.*

*Hab. in prat. Eur. bor. 24. D.*

9. A. VILLARSII: scapo nudo 1-floro calyceque glabriusculo, foliis pinnatifido-dentatis hispidis, pilis simplicibus subulatis. *W. Sp.*

*Hab. in Delphinatu. 24. F. intr. 1807.*

10. A. ASPERA: caule folioso subramoso hirto, calyce glabro, foliis lanceolatis runcinatis hirtis, pilis furcatis. *W. Sp.*

*Hab. in sylv. Hungar. 24. D. intr. 1803.*

#### 914. THRINCIA.

1. T. HIRTA: scapo 1-floro, calyce glabriusculo squamulis aucto, foliis lanceolatis sinuato-dentatis. *W. Sp.*

*Hab. in Europa australiore. 24. D. intr. 1798.*