

cinata, laciniis triangularibus dentatis et incisus pilosiusculis. Involucri phylla lanceolata reflexa. — Blätter schrotsägenförmig; Lappen dreieckig, gezähnt, ziemlich haarig. Hüllblätter lanzettförmig, zurückgebogen. Durch ganz Europa. * P. Kraut und Wurzel officinell. Herba, radix Taraxaci. — *L. bessarabicus* Fisch. diff. foliis lanceolato-linearibus pinnatifido-dentatis et pinnatifidis. In Eur. austr. orient. — *L. alpinus* Hopp. diff. foliis hirsutiusculis, involucri phyllis ovatis. In alpebus Eur. mediae. — *L. serotinus* Kitaib. diff. foliis incano-villosis, laciniis oblongis obtusis. In Europ. austr. orient. — *L. glaucescens* Marsch. diff. foliis runcinato-pinnatifidis glaucis glabris, laciniis lineari-lanceolatis subfalcatis distantibus, involucri phyllis patulis. Ibid.

2. *L. obovatus* Willd. Eirundblättriger L. Folia obovata obtusiuscula dentata. Involucri phylla patula. — Blätter umgekehrt eiförmig, gezähnt, ziemlich stumpf. Hüllblättchen abstehehend. In Spanien. P.

3. *L. salinus* Pollich. Salz L. Folia obverse lanceolata sinuato-dentata glabra. Involucri phylla appressa. — Blätter lanzettförmig, vorn breiter, buchtig gezähnt, glatt. Hüllblätter angedrückt. Im mittl. Europa auf Wiesen. * P. *L. palustris* Smith. *L. lividus* Kitaib. — *L. laevigatus* Willd. diff. foliis runcinato-pinnatifidis. Ibid. An Var.? *L. erectus* Hoffm. *L. taraxacoides* Hoppe. *Scorzonera Taraxaci* Roth. *Planta hispanica* non differt.

4. *L. bulbosus* Linn. Zwieblichter L. Rad. repens tuberifera. Folia petiolata oblongo-lanceolata subdentata glabra. Involucri phylla lineari-lanceolata patula. — Wurzel kriechend, knollentragend. Blätter gestielt, länglich-lanzettförmig, etwas gezähnt, glatt. Hüllblätter linien-lanzettförmig, abstehehend. Im südl. Europa. P. *Hieracium bulbosum* Willd. *Prenanthes bulbosa* Cand.

13. *Apargia*. Pfaffenröhrlein. Peranthod. imbricatum. Rec. nudum. Pappus sessilis plumosus. Hauptkelch dachziegelicht. Blütenboden nackt. Federkrone stiellos, federig. — Meistens gelbe Blumen.

1. *A. alpina* Host. Alpen P. Folia obverse lanceolata sinuato-dentata, pilis simplicibus. Scapus uniflorus superne incrassatus squamulosus pubescens. —

dis. Scapus subnudus uniflorus hirtus. Peranthodium hispidum. — Blätter lanzettförmig, gezähnt oder buchtig gezähnt, filzig, mit vielgetheilten Haaren. Schaft fast nackt, kurzrauh, einblütig. Hauptkelch steifrauh. Im mittl. Europa auf Hügeln. P. Hieracium incanum Linn.

6. *A. Taraxaci* Willd. Löwenzahnartiges P. Folia lanceolata dentata et sinuato-dentata glabriuscula. Scapus 1—2florus subnudus superne valde incrassatus. Peranthodium pilis longis nigricantibus. — Blätter lanzettförmig, gezähnt und buchtig gezähnt, ziemlich glatt. Schaft 1—2blütig, fast nackt, oben sehr verdickt. Hauptkelch mit langen schwärzlichen Haaren. Auf Alpen im mittl. Europa. P. Hieracium Taraxaci Linn. Hedychnois Taraxaci Vill. Picris Taraxaci Allion.

7. *A. autumnalis* Linn. Herbst P. Folia lanceolata dentata et pinnatifido dentata glabriuscula. Scapus ramosus squamosus. Peranthodium glabriusculum aut subhirtum. — Blätter lanzettförmig, gezähnt und buchtig fiederförmig, ziemlich glatt. Hauptkelch ziemlich glatt od. etwas rauh. Im mittl. u. nördl. Europa häufig. * P. — *A. pratensis* differt peranthodio pilis longis fuscis saepe furcatis obsesso, anthodiis majoribus. Ad littora mar. balthici.

14. *Thrinicia*. Thrinicie. Peranthodium calyculatum. Rec. nudum. Pappus fl. in ambitu brevissimus paleaceus, in disco stipitatus plumosus. — Hauptkelch umhüllt. Blütenboden nackt. Federkrone der Blumen im Umfange sehr kurz, spreuartig; in d. Mitte gestielt, fiederförmig. — Gelbe Blumen.

1. *T. hirta* Roth. Rauhe T. Folia spatulato-lanceolata retrorsum dentata hirsutiuscula. Scapus cum peranthodio glaber. — Blätter spatel-lanzettförmig, rückwärts gezähnt, etwas rauh. Schaft und Hauptkelch glatt. Im mittl. und südl. Europa. P. Leontodon hirtum Linn.

2. *T. hispida* Roth. Scharfrauhe T. Fol. spatulato-lanceolata retrorsum dentata aut runcinata hispida. Scapus cum peranthodio hispidiusculus. — Blätter spatel-lanzettförmig, rückwärts gezähnt od. schrotsägenförmig, scharfrauh. Schaft u. Hauptkelch ziemlich scharfrauh. Im südl. Europa. J.