

foetida. 29. I. fol. lanceolato - linearibus integerrimis, corymb. ramosis, radiis florum brevissimis. Pseudo-Helichrysum melitense, retusis foliis viridibus, flore luteo radiato. *Moris. hist. 3. p. 90. (Exclusa Milleri figura.) Affinis Senec. foetido. Habitus Cinerariae.*

958. ARNICA. *Recept. nudum. Pappus simplex. Corollulae radii filamentis & absque antheris.*
1245.

montana. 1. A. foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis. *Fl. dan. t. 63.*

piloselloides. 2. A. fol. integerrimis ellipticis villosis, scapo unifloro aphylo lanato, calyce radium aequante.

scorpioides. 3. A. fol. alternis dentatis mollibus. *Jacq. in Litt. Fl. austr. v. 4. t. 349. Semina omnia papposa.*

Doronicum. 4. A. fol. alternis subserratis, oblongis asperis. *Jacq. in Litt. Fl. austr. 1. t. 92.*

maritima. 5. A. fol. lanceolatis: inferioribus serratis, caule folioso multifloro.

crocea. 6. A. fol. ovatis repando-denticulatis subtus tomentosis. *Folia quibusdam cordata.*

ciliata. 7. A. fol. amplexicaulibus ovatis dentatis ciliatis glabris, caule simplici unifloro. *Thunb. jap. mspt. M.*

japonica. 8. A. fol. inciso-palmatis denticulatis, flor. terminalibus subbinis. *Thunb. l. c. M.*

palmata. 9. A. foliis inciso-palmatis dentatis, flor. paniculatis. *Thunb. l. c. M. Est sine dubio Arnica japonica. Suppl. p. 376. M.*

Gerbera. 10. A. fol. pinnatifidis: lobis rotundatis.

coronopifolia. II. A. fol. pinnatis: laciniis linearibus.

959. DORONICUM. *Recept. nudum. Pappus simplex.*
1247. *Calycis squamae duplicis ordinis aequales, disco longiores. Sem. radii nuda pappoque destituta.*

Pardalianches. I. D. foliis cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus. — *Jacq. Fl. austr. v. 4. t. 350. M. Semina radii*