

1904. nov. 1895-1904.  
*Aster coriaceifolius* Levl. et Vant.  
Sans localite.

*Aster curvatus* Vant.  
Kouy-yang, bord de la riviere de Kou-tou-tang,  
nov. 1897. (Im. Bodinier 1998.)

*Aster Esquivolii* Levl. nov. sp.  
Caulis robusto, diametro 1 cm., longe hirsuto, ra-  
moso, 1 m. 20 alto; folia villosa-hirsuta, elongata,  
anguste lanceolata; flores albicantes et longe  
paniculati; capitula parva; bractea capituli  
linearis a basi ad medium setoso-hirsuta, ad apu-  
cym saepe refracta; akrenio striato, lineari,  
perenne-chitaneo; pappo sericeo alido.  
Cing-tcheou, juin 1912 (Jos. Esquivol 3609)

*Aster Ghehni* Sch.  
Pa-tchou, 800 m. janv. 1912 (Jos. Esquivol 3504.)

*Aster indicus* L.  
Kouy-yang (Im. Bodinier 1739, 1913. 24/4) Bo-tou  
des ruisseaux et des rivières, riches juillet nov. 1897-98.  
f. *albiflora* Levl.  
Ri-ben-bou des routes, juillet 1911 (Esquivol 2702)

*Aster latocorymbosus* Vant.  
Kouy-yang: mont du Coll. de Bois de N. D. de Gesse  
(Bodinier 2473); Sin-Fa (Cavalerie 658); Kia-  
Chuen (Jos. Esquivol) janv.-oct 1897-1905.  
Espèce voisine de *A. trinervis*.

*Aster lofouensis* Levl. et Vant.  
Lo-Fou (Cavalerie); de Kiao-Tai et Kouy-la et jout