

44. *Borkhausia hieracioides, Prodr. MS.*

*B.* radice annua?: caule erecto, ramoso, paniculato, foliarum costâ centrali, pedunculis, anthodiisque setoso-hispidis vel sub-muricato-spinellosis: foliis glabris, indivisis, denticulatis, denticulis rarís, sparsis, minutis, subulatis; radicalibus lanceolato-oblongis, acutis, basi attenuatis; caulinis ovato-acuminatis, basi dilatato-auriculatis, semi-amplexicaulibus: floribus corymbosis; flosculorum ligulis elongatis, laxis, patentissimis, sub-pendulis.

*a. integrifolia;* foliis integriusculis, sub-sinuolatis.

*β. pinnatifida;* foliis sub-pinnato-runcinatis.

Hab. in Maderæ orâ Septentrionali.

45. *Borkhausia dubia, Prodr. MS.*

*B.* radice bienni: caule erecto, stricto, è basi ramoso, ramisque foliatis, costaque centrali foliarum subtûs hispidis: foliis lucidis, glabris, indivisis, marginibus undulatis, sinuato-runcinatis et denticulatis, denticulis intermediis plurimis, inæqualibus, subulatis vel ciliato-setaceis; radicalibus elongatis, oblongo-lanceolatis, acutis, basi attenuatis; caulinis basi cordato-æqualibus, amplexicaulibus, oblongis, acuminatis; summis linearibus, sub-integerrimis, setaceo-ciliatis: floribus sub-corymbosis: ramulis supernè, pedunculis, anthodiisque densè glanduloso-pubescentibus, sub-incanis, farinaceo-puberulis: pappo sub-stipitato.

Hab. in convallibus Maderæ.

Præcedenti proxima; differt autem habitu distinctissimo, ramis supernè, pedunculis, anthodiisque densè glanduloso-pubescentibus, sub-incanis, farinaceo-tomentosis; floribus minoribus in corymbos laterales collectis, flosculorum ligulâ nec elongatâ nec pendulâ, pappo sub-stipitato (quo ad *Crepides* veras accedit), foliarum margine inæqualiter sed conspicue et in omni parte runcinato-sinuatis, caulinis basi æqualibus, cordatis, (non dilatato-auriculatis).

46. *Borkhausia comata, Prodr. MS.*

*B.* radice fusiformi, carnosò: caule erecto, è basi ramoso, foliato, hirto-setoso: foliis indivisis, denticulatis; radicalibus glabris; caulinis