

canaliculé, dentées, raides et un peu ondulées ; les caulinaires sessiles entières, dressées, un peu plus étroites. Tiges de 15 à 20 centim., dressées ascendantes, naissant 2 à 3 d'une racine pivotante annuelle. Plante toute couverte d'un tomentum gris et floconneux. — Fl. août.

Terrains rocailloux, près Miliana.

### ***Barkausia hirsuta.***

Calathides en corymbes ombelliformes à l'extrémité des rameaux, composant eux-mêmes un corymbe fastigié. Péricline à folioles extérieures lâches, ovales obtuses, concaves, largement membraneuses et fortement hérissées sur le dos ; les intérieures le double longues, subtomentueuses et hérissées sur le dos. Akènes scabres insensiblement atténués et grêles seulement dans le  $\frac{1}{4}$  supérieur. Feuilles inférieures lyrées pennatipartites, à segments lobés ou dentés distants, le terminal très grand, atténuées en pétiole grêle ; les caulinaires sessiles, embrassant la tige par des oreilles laciniées ; les moyennes pennatifides ; les supérieures dentées ou entières. Tige dressée rameuse, à racine pivotante, monocarpique. Plante hérissée partout de poils un peu crépus. — Fl. mai.

Champs argileux au Dahra.

### ***Barkausia floribunda.***

Calathides très nombreuses en corymbe composé, à pédicelles grêles et courts. Péricline pauciflore, à folioles peu nombreuses très convexes à la maturité ; les extérieures lancéolées, lâches, scarieuses aux bords ; bractées herbacées, linéaires. Akènes petits, les extérieurs très brièvement rostrés, les autres insensiblement atténués en bec grêle dans le  $\frac{1}{3}$  supérieur. Réceptacle fibrilleux. Feuilles inférieures atténuées en pétiole, lancéolées oblongues, inégalement dentées ou pennatifides lyrées ; les caulinaires sessiles à base lobulée-embrassante, lancéolées ou linéaires. Tige dressée