

BARKAUSIA HYEMALIS.

T. II.

Barkausia foliis radicalibus runcinatis, dentatis, caulini, amplexicaulibus hastato-sagittatis, basi pinnatifidis, calycibus hirtis, squamis exterioribus ovato-lanceolatis.

Hieracium hibernum Cichorii folio tenui *Cup. Hort. Cath.*
p. 95.

Hieracium hiemale Cichorii folio hirtum *Cup. Panph.*
t. 12 et 171 - *Bonan. t. 125.*

Radix fusiformis, ramosa, extus nigrescens.

Caules modo erecti, modo basi decumbentes, a semipede ad sesquipedem alti, angulati, sulcati, ramosi, purpurascens, pilis hirsuti simplicibus nigricantibus.

Folia glabra vel leviter hirsuta: radicalia petiolata, nonnunquam integra, saepius pinnatifida, runcinata, lobis acutis, inaequaliter dentatis, extremo majori quandoque obtuso, caulina amplexicaulia, hastato-sagittata, pinnatifido-dentata.

Flores corymboso-paniculati, citrini, semiflosculis exterioribus dorso purpurascens.

Calyx tomentosus foliolis carinatis, pilis nigris hirsutis, exterioribus ovato-lanceolatis, margine membranaceis, subinde laxis.

Semina flava, sulcata, gracilia, sub lente scabra, pap-
po simplici, stipitato, glabro.

Receptaculum areolatum, areolis margine villosiusculis,
medio mammillatis.

Habitat circa *Panormum* in pratis et pascuis, muris to-
ctisve.

Perennis. Floret *Hyeme et Vere*.

