

pedunculi erecti, uniflori, nudi, basi folio ovato-lanceolato integro bracteæformi sussulti; flores majores quam Crepidis vesicariae, pallide flavi; calyces tomentosi, fructiferi angulati, squamis exterioribus quatuor ovatis acutis scariosis patentibus interioribus linearibus margine membranaceis duplo brevioribus; pappus niveus, stipitatus; semina sulcata, muricata.

Affinis *B. vesicariae* (Crepis Lin.), sed differt: 1) hispiditate glandulosa; 2) foliis runcinato-lyratis, laciñiis lunato-reflexis; 3) pedunculis ebracteatis; 4) floribus majoribus; 5) squamis calycinis exterioribus quaternis.

130. BARKHAUSIA nuda,

B. foliis runcinatis glabris, scapis adscendentibus aphyllis glabris multifloris, pedunculis quadran-culis calycibusque hispidis, squamis calycinis exterioribus adpressis.

Hieracium minus dentis Leonis folio obtuso caule procumbente exili multifido intricato, flore parvo.

Bonan. t. 154.

Hab. in pascuis montosis Messinae. ♂. fl. Jun. Jul.

Planta tenera, vix pedalis; radix annua, ra-mosa, fuscescens: folia radicalia runcinata, acuta, glabra; scapi adscendentes, ramosi, aphylli, si folia linearia integerima ad singulum ramulum

exorientia folia vocare non velis, paniculati, multiflori, striati, subangulati, glabri; pedunculi uniflori, quadranguli, bracteolati, hispidi; flores parvi Barkhausiae leontodontoidis (Crepis All.) duplo minores, flavi; calyces hispidi, squamis calyculi cartilagineis adpressis calyce duplo brevioribus; pappus breviter stipitatus, niveus; semina sulcata glabra.

Habitus praesertim foliorum Barkhausiae leontodontoidis, sed differt: 1) pedunculis quadrangularis calycibusque hispidis; 2) floribus duplo minoribus; 3) pappo brevissime stipitato; 4) teneritate omnium partium.

ANDRYALA.

131. ANDRYALA undulata.

A. foliis oblongis sinuato-dentatis, undulato-crispis cauleque mollissime tomentosis, floribus corymbosis aggregatis, pedunculis multifloris calyceque piloso-glandulosis.

Hieracium marinum tomentosum incanum *Cichorii* folio inflexo lactescens, flore candido medio citrino. Bonan. t. 126.

Hab. in arvis arenosis sterilibus prope Panormum Siciliae. ♂. fl. Maj. Jun.

Herba lactescens undique mollissime tomentosa, tomento facile secedente. Radix annua, fuscescens,