

- p. 109. *Crepis incarnata* Vis.! dalm. sp. p. 17. t. 6. f. 2. Flores incarnati. Variat caulibus erectis solitariis aut plurimis adscendentibus, foliis plùs minùs pinnatifidus, (nunquam tamen adeò indivisis ac in icone Bauh. prod. 68. f. 2. exhibentur), superficie glabrâ aut minutè puberulâ. Conf. Ten. syll. p. 404. (v. v. c. et s. sp.)
32. *B. GRAVEOLENS* (Link enum. 2. p. 290), sparse pilosa, caule erecto ramoso, foliis caulinis amplexicaulibus acutè pinnatifidis, pedicellis elongatis, invol. breviter villosa-subcanescentis squamis exter. adpressis lineari-lanceolatis, achæniis radii brevius rostratis. (I) patr. ign. Cor. flavæ, exteriores subtus rubentes. (v. s.)
33. *B. CANDOLLEI* (Spreng. syst. 3. p. 657. et 4. p. 304. excl. syn.), caule diffusè ramoso erecto basi puberulo supernè glabro, foliis omnibus oblongis sinuato-dentatis semiamplexicaulibus glabriusculis, ramis elongatis 1-cephalis, invol. squamis ext. adpressis brevibus linearibus, inter. subtomosis hispidis. (I) patr. ign. Herba 1-1 ½-pedalis. Achænia adulta rostrata, juniora vix subrostrata. An fortè *Chondrilla De Candollei* Spreng. ex Steud. nom. eadem? (v. v. c. in h. genev.)
34. *B. ZACINTHIA* (Margot et Reut.! fl. zac. ined.), tota (præsertim in invol.) pilis patulis glandulosis hispida, caule à basi ramosissimo infernè folioso, ramis elongatis subnudis, foliis infer. oblongis infernè attenuatis subdentatis incisus, rameis sessilibus acuminatis basi incisus, invol. squamis longè hispidis eglandulosis, exter. lineari-subulatis. (I) in insulâ Zacintho legit el. Margot! Cor. flavæ, marginales subtus rubentes. Achænia breviter, disci longè rostrata. Differt à *B. glandulosa* et foetidâ pilis eglandulosis, à cæteris ejusdem sect. involucre multò longius hispido. (v. s. comm. à cl. inv.)
35. *B. GLANDULOSA* (Presl fl. sic. p. xxxi. Griess. in linnæa 1830. p. 417), hirta-scabra, caule basi simplicissimo erecto stricto, foliis infer. petiolatis runcinatis, super. sessilibus sagittatis, lanceolatis basi dentatis, pedunculis corymbosis involucrique pilis glanduliferis hirtis. (I) in collinis regni Neapolitani, ad Bocco di Falco (Guss!), in Sicilia ad Cataniam (Spling!) et circâ Odessam (Bess!). *Crepis glandulosa* Guss.! ind. sem. 1825. pl. rar. p. 329. t. 56. non Brot. — Cup. panph. ed. Bon. t. 119. Herba trita odorem Amygdali amaræ spirat. Achænia ext. vix rostrata, inter. longè rostrata. (v. s.)
- β. pinnatifidus*, foliis plerisque pinnatifidis, lobis aliis amplis triangularibus, aliis intermediis dentiformibus parvis. — in Sicilia (Guss!). An fortè species propria? (v. s.)
36. *B. FORTIDA* (DC. fl. fr. ed. 3. p. 2948), hispido-canescens, caule erecto simplici folioso apice corymboso, foliis acutè runcinato-pinnatifidis, inferioribus petiolatis, super. hastato-lanceolatis basi incisus, capitulis antè anthesin cernuis, in invol. pilosis squamis exter. lanceolatis, achæniis radii breviter rostratis. (I) in Europæ mediæ et australis versuris ruderatis et agris nec non in Tene-riffâ (C. Sm!) et Tauriâ (Bieb. Stev!). *Crepis foetida* Linn. sp. 1133. Sow. engl. bot. t. 837. *Picris foetida* Lam. fl. fr. 2. p. 108. *Wibelia graveolens* fl. Wett. 3. p. 144. *A. amygdalina* Lag. cat. h. madr. 1814. p. 3. excl. syn. *Crepis foetens* Link in Buch. can. 147. *Crepis barbata* Mill. non Linn. *Hostia foetida* Moench. — Lob. ic. t. 22. f. 1. Moris. ox. s. 7. t. 4. f. 4. Magn. bot. t. 128. Herba odore Amygdali amari. Variat in sterilibus caule simplicissimo 1-cephalo ex Fleuret! in litt. (v. v. et s.)
37. *B. RHÆADIFOLIA* (Bieb. suppl. p. 538. Reich. fl. exc. 1. p. 257), diffusa ramosa scabra, foliis runcinatis laciniisque acuminatis acutè dentatis, involucri glandulosis villosa-hispidis. (I) in Iberiâ (Bieb.), in Germaniâ (Reichenb.). *Crepis rhæadifolia* Bieb. fl. taur. n. 1625. Caulis sulcatus Folia ferè Papaveris *Rhæadis*. Squamæ inv. ext. subulatæ laxæ. Pappus ex fl. taur. sessilis, ex suppl. stipitatus, ex Reichenbach disci stipitatus, radii sessilis. An var. *B. foetidæ*? †
38. *B. BYZANTINA*, caule erecto ramoso sulcato infernè hispidis supernè scabro, foliis hispidis pinnatifidis, lobis triangularibus acutis superioribus subdentatis, lobis dentibusve spinuloso-mucronatis, rameis amplexicaulibus, invol. campanulati glandulosi squamis lineari-lanceolatis, achæniis radii brevissimè,