

DCCLXXXVI. CALAIS — *Hymenonema* *Hook. fl. bot. am. 1. p. 300 non Cass.*

Capit. multiflorum. Invol. duplex, exterius brevius calyculiforme 3-6-phylum, inter. cylindraceum 10-12-phylum squamis biserialibus. Recept. epaleaceum. Cor. invol. subæquales. Achænia teretia apice attenuata rostrata muricata aut scabrida. Pappus paleis 5 uniserialibus, basi latè scarioso-dilatatis corollarum contortarum more invicem sæpè incumbentibus, apice in setas breviter scabridas desinentibus. — Herbæ Californicæ glabræ annuæ. Radix exilis simplex. Folia radicalia elongata utrinque acuminata linearisub lanceolata, nunc integerrima, sæpius medio inciso-pinnatifida, lobulis acuminatis. Scapi nudi 1-cephali circ. foliorum longitudinem adæquantes aut iis longiores. Cor. fortè ex sicco flavescentes seu pallidæ. — Nomen hominis cujusdam mythologici qui squamas dorso gerebat. — An genus dividendum?

### Sect. I. EUCALAÏS.

Invol. stricto sensu calyculatum, squamis brevibus. Pappi paleæ basi scariosæ dilatatae, sensim in setam productæ. — Scapi apice furfuracei.

1. *C. DOUGLASIT*, scaposa, foliis glabriusculis, scapis apice furfuraceo-pubescentibus, pappi paleis rufis in setas sensim desinentibus. (I) in California legit cl. Douglas. (v. s. comm. ab hon. soc. hortic. londin.)

### Sect. II. CALOCALAÏS.

Invol. squamis 3-4 longiusculis basi instructum. Pappi paleæ scariosæ apice bifidæ et ex sinu setam proferentes. Scapi caulesve apice glaberrimi.

2. *C. LINDLEYI*, subscaposa, glabra, pappi paleis rufescens apice bifurcatis et ex sinu setam proferentibus. (I) in Americæ borealis orâ occidentali. An ad hanc aut ad priorem referendum *Hymenonema laciniatum* brevissimè descriptum in *Hook. fl. bor. am. 1. p. 301?* Folia ferè pinnatipartita. Scapus luceus crassiusculus fortè fistulosus. Achænia striata. Pappus radii longè membranâ scariosâ apice emarginatâ instructus, disci membranâ breviori subbifidâ marginatus. In horto soc. hortic. Londin. cultam cl. Lindley filio comm. (v. s.)

3. *C. LINEARIFOLIA*, caule basi folioso subramoso apice nudo, foliis linearibus integrerimis villo molli ciliatis, cæterùm adultis glabris, pappi paleis albis longè scariosis apice bifidis ex sinu setam proferentibus. (I) in California legit cl. Douglas et circâ Fort-Vancouver cl. Garry. *Hymenonema? glaucum* *Hook. fl. bor. am. 1 p. 300.* Folia inferiora latiora, nascentia velutina, adulta glabra. Invol. squamæ exteriore paucæ lanceolatae. Achænia subnudiculata longius rostrata. Cor. non vidi. (v. s.)

DCCLXXXVII. TOLPIS *Bivona monogr. 1809. Spreng. syst. 3. p. 670.* — Tolpis et Schmidtia *Less. syn. 129.* — Crepidis et Hieracii sp. *Auct.*

Capit. multisflorum. Invol. pauciseriale, extùs bracteis linearisetaeis calyculatum aut circumdate. Recept. areolatum nudum. Achænia turbinata striata erostria conformia. Pappus 1-serialis, setis scabris rigidulis 2-20, rariùs in floribus radii nullis, setulis minimis squamellæformibus interjectis, aut ubi setæ desiderantur pappum radii totum conficientibus. — Herbæ, rariùs suffrutices, regionum Mediterraneanarum plerumque incolæ. Caules subnudi aut foliosi, sæpè dichotomi, apice laxè corymbosi, pedicellis sub capitulo incrassatis et sæpè bracteolatis. Folia lanceolata dentata incisa aut pinnatifida. Capitula flava, interdùm in centro fusca, exsiccatione plerumque virescentia.