

h. in pratis copiose β . abunde in agris et viis. Annuæ.
biennis L., foliis runcinato-pinnatifidis scabris, basi
 superne dentatis: calycibus carina muricatis: caule tripedali
 altiorique.

h. in pratis, prope *Cosfelden* et *Sterzhausen*. Biennis.
tomentosa, calycibus basi albo tomentosis: foliis radi-
 calibus pinnatifidis supremis linearibus hastatis: caule sub-
 dichotomo. *Crepis Dioscoridis* Linn.

Hieracium majus Dioscoridis. *Tabernaem. icon.* 180.
bona.

h. H. Annuæ.

parviflora, caule erecto tereti ramoso glabro: foliis
 imis runcinato-lyratis ovatis obtusis: intermediis lanceola-
 to-runcinatis dentatis basi incis: supremis lanceolatis integ-
 ris: calycibus levissimis.

Calyces duodecim - sexdecimflori. Corollulis luteis.
 Planta tota glabra levis.

Crepidem strictam Scopoli *Fl. carn.* 2. p. 99. *Tab.* 47:
 pro eadem haberem, nisi folia radicalia in meis perfecta
 runcinato lyrata, quæ in *icone* citata non lyrata sunt expressa.
Crepis neglecta Linn. forte eadem planta: differt calycibus
 foliisque levissimis.

h. H. Annuæ.

paludosa, foliis glabris dentatis: imis petiolatis: supe-
 rioribus amplexicaulibus: ovato lanceolatis: calycibus pilis
 nigris obsessis. *Hieracium paludosum* Linn.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus. C.
Baub. Morison. III. Sect. 7. *Tab.* 7. *fig.* 44.

h. in pratis paludosis, frequens in *der Lummersbach*
 prope *dem Neubof*, et retro *der Marbach*. Perennis.

CATONIA.

Flores hermaphroditi. Calyx oblongus calyculatus: fo-
 liolis calycis lanceolato-linearibus acutis subsquarrosis: folio-
 lis

lis calyculi laxissimis subaequalibus. Pericarpia oblonga angulata levia aequalia libera fusco - rubra: pappo persistenti.

sagittata, foliis sagittatis ovato-oblongis sessilibus glabris: pedunculis axillaribus aequalibus simplicibus: supra pilosis: calycis foliolis setis nigris hispidis. *Crepis austriaca*. *Jacquin. Enum. observ. p. 270. icon. Tab. 5. Allione Fl. Pedem. n. 808, icon. Tab. 30. fig. 1. Hieracium pyrenaicum Linn. 1.*

h. H. Perennis.

cordifolia, foliis pilosis: superioribus cordatis dentatis amplexicaulibus: caule striato piloso superne ramoso. *Hieracium amplexicaule Linn. Gouan. Illustr. p. 58. Allione Fl. Pedem. n. 792, icon. Tab. 15. fig. 1.*

h. H. Perennis.

Ab Hieraciis differt cum receptaculo tum calycis figura: a Crepidibus figura calycis et persistentia pappi, quare novum genus constitui.

In memoriam *Caronis Auct. de re rustica.*

PAPPUS SESSILIS PLUMOSUS.

PICRIS. *Gaertner. 2. p. 366. Tab. 159. Linnæi species.*

Flores hermaphroditi. Calyx oblongus involucreto involucreto laxo inaequalibus. Pericarpia oblonga longitudinaliter et transversaliter striata. Receptaculum punctulatum excavatum.

hieracioides L. caule aspero striato ramoso: foliis caulinis sessilibus lanceolatis undulatis pilosis scabris: pedunculis squamosis.

h. in pratis prope *Giessfelberg an der Schneisse. Annua.*

MEDICUSIA.

Flores hermaphroditi. Calyx ovatus calyculatus: foliolis calyculi linearibus laxis apice inflexis inaequalibus: foliolis