

140. — *Cephalorhynchus confertus* Conrath et Freyn, 1895, Bull. Herb. Boiss., 1 sér., 3 : 477. — *Cicerbita conferta* (Conrath et Freyn) Beauverd, 1910, l. c.: 140.

Описан из Грузии («in Iberia»). Тип: «Ex Iberia, Steven, a. 1806» (LE!).

СЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ: Адж.; ЦЗ: Карт.-Ю.Ос.; ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан.

Указан для ЗП: Аз.-Куб. (Галушко, 1980 : 251); ЮЗ: Ю. Караб. (Аскерова, 1961 : 560); ЦЗ: Лори; ВЗ: Мург.-Муровд.; ЮЗЗ: Араг.; ЮЗ: Севан., Дар. (Назарова, 1995 : 165); ЦЗ: Триал.-Н.Карт. (Шхиян, 1952 : 692).

Южн. и Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия (?).

2. *C. microcephalus* (DC.) Schchian, 1952, Фл. Груз. 8 : 693. — *Lactuca microcephala* DC. 1838, Prodr. 7 : 134. — *Cephalorhynchus aucheri* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Orient. Nov., sér. 1, 7 : 11, nom. illeg. superfl. — *C. candolleanus* Boiss. 1875, Fl. Orient. 3 : 820. — *Cicerbita candolleana* (Boiss.) Beauverd, 1910, Bull. Soc. Bot. Genève, 2 sér., 2 : 140. — *Cephalorhynchus kirpicznikovii* Grossh. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 13 : 31. — *C. tuberosus* auct. non (Stev.) Schchian: C. Jeffrey, 1975, Fl. Turk. 5 : 774.

Описан из Ирана («in Persia»). Тип: «Persia, 1837, N 3517, Aucher-Eloy» (G-DC, photo — LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для ЮЗ: Дар. (Назарова, 1995 : 166).

Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. *Quasibrassica* Sennik. sect. nov.

Achaenia griseo-brunnea, sectione compressiuscula, superne angustata et apice in rostrum breve (1 mm lg.) abrupte attenuata, 12(15) costata. Rami inflorescentiae generalis sub calathidiis non incrassati.

Семянки серо-коричневые, в сечении слабо сжатые, на верхушке суженные и внезапно оттянутые в короткий (1 мм дл.) носик, с 12 (15) отчетливо выступающими ребрами. Ветви соцветия под корзинками не утолщенные.

Тип: *C. brassicifolium* (Boiss.) Tuisl.

3. *Cephalorhynchus takhtadzianii* (Sosn.) Kirp. 1964, Фл. СССР, 29 : 349. — *Zollikoferiastrum takhtadzianii* (Sosn.) R. Kam. 1993, Опред. раст. Ср. Аз. 10 : 628, 126. — *Lactuca takhtadzianii* Sosn. 1941, Сообщ. АН Груз. ССР, 2, 7 : 653 (n. v.).

Описан из Армении. Тип: «Daralagez, inter Khachik et Achura, 1940, A. Takhtadzian» (ERE) (fide Tuisl, 1968 : 621).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах.

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран: «inter Tabriz et Ahar» (Tuisl, 1968)).

Mycelis Cass.

1824, Dict. Sci. Nat. 33 : 484.

Семянки веретеновидные, сплюснутые, довольно быстро оттянутые в длинный, в верхней части беловатый носик, с 12 неравными ребрами (боковые и иногда центральные на каждой плоскости ребра наиболее утолщенные и выступающие, боковые узокрыловидные). Внутренний ряд паппуса из снежно-белых, сильно зазубренных, равных по толщине (около 15 мкм в основании) щетинок; наружный ряд из многочисленных коротких щетинок.

Тип: *M. angulosa* Cass. nom. illeg. (=*M. muralis* (L.) Dum.).

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА *MYCELIS*

1. Корзинки с 5 цветками, до 10 мм дл. и 1 мм шир.; листочки наружного ряда обертки 1—2 мм дл.; стебель тонкий (у основания 2—3 мм шир.) *M. muralis*.