

0.2 mm lg.). — Многолетник. Стебли одиночные, прямостоячие, 40—80 см выс., голые, только в соцветии железисто-щетинистые. Нижние и средние стеблевые листья серовато-зеленые, голые, перистораздельные, с линейной или узколанцетной конечной долей, с 3—8 парами боковых долей, линейных или ланцетных, цельнокрайних, острых, обычно сильно отклоненных к верхушке; самые верхние листья обычно цельные, линейные. Общее соцветие кистевидно-метельчатое. Обертки 8—9 мм дл., темно-зеленые, более или менее железисто-щетинистые, редко голые, с 5—7 наружными листочками, которые вдвое-втрое короче внутренних. Цветки белые. Семянки сплюснутые, эллиптические, 3.5—4 мм дл., с сильно угольщенными боковыми ребрами; носик около 0.7—1.2 мм дл. Паппус 5.5—6.5 мм дл.; его наружные щетинки многочисленные, очень короткие (около 0.2 мм дл.).

Типus (тип): «Kam (Tibet), systema fl. Jan-Tzsy-Tzjan in viciniis pag. Kab-czgi-Kamba ad fl. Chi-czjy, 12100 fl., 21 VII 1900, N 349, V. F. Ladygin» (LE, cum isotypo).

Paratypus (паратип): «Пров. Кансу, хребет к югу от р. Тетунг, средний лесной пояс, 2700 м, во влажных лесах, цветки белые, 23 VII—4 VIII 1880, N 671, Н. М. Пржевальский» (LE).

Affinitas (родство). A specie proxima — *C. prattii* Dunn floribus albis et foliolum lobis deorsum valde declinatis differt. — От наиболее близкого вида — *C. prattii* Dunn отличается белыми цветками и сильно отклоненными книзу долями листьев.

Chaetoseris potaninii Tzvel. sp. nov. — Planta perennis. Caules solitarii. erecti, 80—150 cm. alti. Folia radicalia cito emortua, caulina sat numerosa, sessilia, basi sagittata, pinnatifida, axi late alata in lobum terminalem linearis lanceolatum longum transiente; lobi laterales 1—3-jugi, difformes, sed sat lati, saepe 1—2-dentati, interdum hamati. Pedunculi sat dense glanduloso-setosi. Involucra 8—10 mm lg., viridia, phyllis externis internis duplo-triplo brevioribus. Flores rosei. Achenia ca. 4 mm lg., compressa; rostrum ca. 1 mm lg. Pappi externi setae valde reducti, in modum limbo denticulato cingit. — Многолетник. Стебли одиночные, прямостоячие, 80—150 см выс. Прикорневые листья быстро отмирающие, стеблевые довольно многочисленные, сидячие, у основания стреловидные, перистораздельные, с широко крылатой осью, переходящей в длинную линейно-ланцетную конечную долю; боковые доли в числе 1—3 пар, различной формы, но довольно широкие, часто с 1—2 зубцами, иногда крючковидные. Ножки корзинок довольно густо железисто-щетинистые. Обертки 8—10 мм дл., зеленые, с наружными листочками вдвое-втрое короче внутренних. Цветки розовые. Семянки около 4 мм дл., сплюснутые; носик около 1 мм дл. Щетинки наружного хохолка сильно редуцированные, в виде мелкозубчатой каймы.

Типус (тип): «Kam, vallis fl. Fu-bjan-cho inter pag. La-ma-sy et opp. Fubin, 3 VIII 1893, leg. Kashkarov» (LE, cum isotypis 2).

Affinitas (родство). A speciebus proximis — *C. prattii* Dunn et *C. robورowski* (Maxim.) Shih reductione pappi setis externis et habito differt. — От наиболее близких видов — *C. prattii* и *C. robورowdkii* — отличается редукцией наружных щетинок паппуса и общим обликом.

Вид назван в память выдающегося исследователя Центральной Азии — Г. И. Потанина.

Тип и 2 изотипа этого вида являются частями одной и той же особи, которая похожа на очень крупную особь *C. prattii*, но имеет щетинки наружного хохолка семянок, редуцированные до очень узкой зубчатой каймы. По-видимому, эндемик Камского нагорья в Китае.