

Folia prima s. radicalia in α . integra, in β . sinuata.
Raj. angl. 3. p. 161.

- canadensis. 4. LACTUCA foliis lanceolato-ensiformibus dentatis
inermibus.

Lactuca canadensis altissima angustifolia, flore pallide
luteo. *Tournef. inst.* 474.

Sonchus sylvestris, folio laciniato glauco; costa non spi-
nosa. *Raj. suppl.* 137.

Habitat in Canada. Kalm.

Differt à sativa caule altiore; Foliis quadruplo longioribus; angustioribusque; Racemo terminali longo, composito, nec corymbose.

- saligna. 5. LACTUCA foliis hastato-linearibus sessilibus carina
aculeatis *Amoen. acad.* 1. p. 150.

Lactuca foliis linearibus hastatis: inferioribus dentatis.
Roy. lugd. 121.

Lactuca foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus ba-
si hastatis, dorso serratis. *Sauv. monsp.* 692.

Lactuca foliis radicalibus linearibus dentato pinnatis: la-
ciniis sursum dentatis: caulinis alato-lanceolatis, flo-
ralibus linearibus sessilibus. *Gnett. stamp.* 374. *Dalib. paris.* 236.

Lactuca sylvestris altissima, foliis inferioribus dentatis,
superioribus acuminatis integris. *Raj. suppl.* 135.

Lactuca sylvestris altera, angusto saligno folio: costa
albicante. *Rupp. jen.* 167. *Hall. jen.* 207. t. 4. optim.

Lactuca sylvestris, angusto-laciniato folio. *Magn. monsp.*
298. *

Endivia minor lactucina spinosa. *Barr. ic.* 136.
Habitat in Gallia, Lipsiæ.

- perennis. 6. LACTUCA foliis linearibus dentato-pinnatis: laciniis
sursum dentatis. *Hort. cliff.* 384. *Roy. lugd.* 121.
Dalib. paris. 236.

Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. *Bakb.*
pin. 120.

Chondrilla. *Dod. pempt.* 637.

Apate. *Dalecb. hist.* 561.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. &

CHONDRILLA.

1. CHONDRILLA. † *Hort. cliff.* 383. *Roy. lugd.*
120. *Hall. helv.* 755. *Gmel. sibir.* 2. p. 8.

814. LACTUCA. * *Tournef.* 267. *Vaill. A. G.*
1721. 17.

- CAL. *Communis* imbricatus, ovato-oblongus: *Squamis* plurimis, acuminatis.
- COR. *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis, æqualibus, calyce brevioribus.
Propria monopetala, ligulata, truncata, quadri-quinque-dentata.
- STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.
- PIST. *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.
- PER. nullum. *Calyx* connivens, ovato-cylindraceus.
- SEM. solitaria, ovata, acuminata, compressa, terminata *Stipite* longo, inferne attenuato, superne crassiore, proferente *Pappum* simplicem.
- REC. nudum.

815. CHONDRILLA. * *Tournef.* 268. *Vaill. A. G.*
1721. 12.

- CAL. *Communis* auctus, cylindraceus: *Squamis cylindri* plurimis, parallelis, linearibus, æqualibus. *S. basens* paucis, brevissimis.
- COR. *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quadri-quinque-dentata.
- STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.
- PIST. *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.
- PER. nullum. *Calyx* cylindraceus, oblongus.
- SEM. solitaria, ovata, compressa, scabra, terminata *Stipite* longo, inferne crassiore, superne attenuato, proferente *Pappum* simplicem.
- PEC. nudum.