

gissima sinuato dentata. *Folia* media hastata, superiora lanceolata. *Corollæ* pallide rubræ.

Ich fand diese Pflanze nur ein einziges mal bey Arheilgen unweit Darmstadt im Walde.

5.) *Chondrilla acanthophylla*.

Foliis brevibus lanceolatis sessilibus strictis, ad nervum & marginem spinosis; caule ramosissimo; floribus sessilibus lateralibus terminalibusque.

Descriptio.

Caulis bipedalis, altior, rectus, rigidus, ramosissimus, basi pilosus, scaber, teres angulosus, superiora versus glaber, e glauco viridis, intus medullosus & ad venerationem lac fundens. *Folia* radicalia in rosæ formam congesta & caulina inferiora, uti in *Chondrilla juncea*, lanceolata, pinnatifida, sinuato denticulata, in petiolum decurrentia, pilis rarioribus scabra; caulina superiora & ramea vero late lanceolata, sessilia, glabra, glauco viridia, denticulata, singulis denticulis spinula adunca terminalis. *Costa* inferioris paginæ similiter spinulis aduncis armata. *Flores* ad caulis ramorumque apices & ad ipsorum latera plerumque fasciculatim sessiles sunt. *Corolle* multo majores ac in *Chondrilla juncea*, & corollas *Crepidis tectorum* magnitudine æquant.

Bey Darmstadt und Arheilgen fand ich diese, so viel ich weiß, noch nirgends beschriebene Pflanze. Ich halte sie für eine von den übrigen Chondrillen verschiedene Art; dann die Stengel und Astblätter, welche bey der *Chondrilla juncea* linienförmig, oder linien-lanzettförmig und sehr schmal und bey der *Chondrilla crepoide* pfeilförmig sind, fand ich bey dieser Art allzeit breit lanzettförmig, und viel kürzer als bey den

andern Arten. Mehrere Individuen, welche ich sowohl bey Darmstadt als bey Arheilgen fand, stimmten in allem überein, und unterschieden sich deutlich von der Chondrilla juncea, welche in eben den Gegenden zum Verdrusse der Güterbesitzer nur zu häufig auf den Aeckern wächst.

Ich fand sie zu Ende des Julius und im August blühend.

6.) *Orobanche arenaria.*

Caule simplicissimo, floribus quinquefidis, staminibus corolla brevioribus.

Descriptio.

Caulis digitalis, palmaris, interdum pedalis albus aut purpureo cæruleus, pubescens, alternatim bracteis ovato subulatis brunneis foliorum loco obsitus. *Calyx* monophyllus, ventricosus, retrorsum lacerus, quadrifidus: laciniis æqualibus, interdum quinquefidus: lacinia quinta ad fissuram calycis brevissima. (Vidi etiam calyces trifidos.). *Bractæ* tres ad calycis basin, quarum duæ laterales breviores, tertia infima major bracteis caulem ventientibus subæqualis. *Corolla* inæqualis, ringens, purpureo cærulea, pubescens. *Tubus* calycis tubo duplo longior, subincurvus; *faux ventricosa*; *limbus* obsolete bilabiatus: labio superiore bifido: laciniis crenulatis; labio inferiore tripartito, intus duabus eminentiis longitudinalibus albis instructo. *Stamina* corolla breviora: antheræ cohærentes fuscescentes. *Pistillum* staminibus longius: *Stigmate* capitato bipartito.

Ich fand diese Pflanze häufig bey Arheilgen auf eben den dünnen Sandhügeln, wo ich auch die vorbeschriebene Pflanze fand. Sie kommt bald einzeln, bald zu