

cibus tecta. Carpella ovata, rugoso-venosa, multilocularia, basi rotundata; areola insertionis sublaterali, perforata, intus appendiculo cuculliformi areolam insertionis tegente.

— Genus ab *Anchusa* L. et affinis omnibus distinctum carpellorum areola tecta appendiculo cuculliformi, nec cincta margine elevato, ubivis aequali.

C. SEMPERVIRENS F. et T. *Anchusa sempervirens* Linn.

495. CHONDRILLA BREVIROSTRIS FISCH. et MEY. Ch. caule ramoso; foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus subintegerrimis basi setosis; calathidiis omnibus pedunculatis; rostro subcrasso persistente achaenio triplo brevioro basi squamulis oblongis obtusis erectiusculis cincto.

— *Ch. juncea* Ledeb. *fl. alt.* IV. p. 147 (excl. syn.). — Affinis hinc *Ch. juncea* et *Ch. gramineae*, illinc *Ch. piptocomae*; ab illis differt rostro perbrevis, ab hac rostro cum achaenii parte seminifera continuo persistente (non articulado deciduo). — Hab. in regionibus altaicis hinc iude. ②

554. CLAYTONIA PEREOLIATA DON.

α. elatior, laete virens; folia radicalia et petala latiora; sepala longiora. *C. perfoliata* Don. *C. cubensis* Humb.

β. humilior, praecocior, saepe ex purpurascente virens; folia radicalia et petala angustiora; sepala breviora. —

Hab. in Nova California, circa coloniam Ruthenorum Ross. ①

564. CONRINGIA PLANISILIQUA FISCH. et MEY. C. siliquis

compressis margine incrassatis, enervibus venulosis. —

Habitu et foliis *C. orientali* similis. Flores flavi. Siliqua

elongata, gracilis, linearis, compressa, torulosa, margine incrassata, in stylum acuminata. Valvulae planae,

venis tenuissimis notatae, enerves, margine incrassatae.

Hab. in Iberiae collibus schistosis prope Tiflis. ①

596. CREPIS ALPESTRIS Tsch. β ligulis subtus discoloribus.

— *Hieracium Columbae* Ten. *Syll. pl. Neapol.* p. 398. Ten.