

- sativa.* 2. L. fol. rotundatis caulinis cordatis, caule corymbofo.
- Scariola.* 4. L. fol. verticalibus carina aculeatis. γ . *Folia inferiora runcinata. obliqua s. verticalia; Caulina superiora amplexicaulia, sagittata, carina laevi margine scabro.*
- virosa.* 5. L. fol. horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Caulis inferne aculeatus. Folia sagittata, sessilia, margine et imprimis carina aculeolatis. Varietas prioris ex Gerardo et Hallero.*
- saligna.* 6. L. fol. hastato-linearibus sessilibus carina aculeatis.
- canadensis.* 3. L. fol. lanceolato-ensiformibus amplexicaulibus dentatis inermibus. *Pappus sessilis, ut in Soncho.*
- indica.* L. fol. lanceolato-ensiformibus sessilibus inaequaliter dentatis. *Mant. 278.**
- perennis.* 7. L. fol. linearibus dentato-pinnatis: laciniis sursum dentatis.

910. CHONDRILLA. *Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus simplex, stipitatus. Flosculi multiplici serie. Sem. muricata.*

1120.

- juncea.* 1. C. fol. radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *Caulis inferne strigosus.*
- crepoides.* C. fol. sagittatis amplexicaulibus, caule simplici, flor. subsessilibus lateralibus. *Posset Crepidis generi associari. Caulis simplex, saepiusque simplicissimus, sesquipedalis, basi purpureo striatus, adpersus setis albis raris. Folia Turritidis sagittata, amplexicaulia, indivisa, oblonga, scabra margine et imprimis carina albidis pilis; supra laevia, infima, denticulata. Flores alterni pedunculo vix calycis longitudine, bractea una alterave. Calyx cylindricus, striatus, adpersus tuberculis nigris seta alba. Calyx inferior brevissimus, foliolis subulatis persistentibus. Corolla lutea, subtus purpurascens, longitudine calycis. ☉*
- nudicaulis.* C. scapo nudo flor. paniculatis. *Mant. 278.* Chondrilla lactuceae foro juliensis. Raj. hist. 228? Lactuca nudicaulis. Murray in Comm. nov. Gott. T. 3. p. 74. t. 4.*