


To Prof. Dr. N. N. V. K. *With best regards*  
РЕЗИНОТРЕСТ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ КАУЧУКОНОСОВ

30.5.1935.

M. M. ИЛЬИН  
K

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
*Kriticheskij Obzor*  
РОДА CHONDRILLA L.  
*roda*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА

1930

тельчатое соцветие; обертка с тонким сероватым пушком, впоследствии часто голая. Семянки, за исключением носика 4—6,75 (б. ч. 4-5) мм дл. полосато-валиковатые, образующие на верхушке у основания носика хорошо развитую коронку из различной формы то цельных, то трехзубчатых чешуек, ниже которой в верхней половине семянки распределены отдельные чешуйки и бугорки, более густо собранные под коронкой; носик в 2—6 раз короче семянки, 0,5—2,5 мм дл., без сочленения. Летучка 5—10 мм дл.

f. *typica* Iljin. Rostrum achaenio subtriplo brevior.

Носик в 2-3 раза короче семянки.

f. *abbreviata* Iljin. Rostrum achaenio 3,5—6-plo brevior.

Носик в 3,5—6 раз короче семянки (рис. 27 А).

Встречается, главным образом, от р. Волги на восток: Калмыцкая авт. обл., бывш. Астрахан. губ., Стalingрадск., Казакстан в пределах бывш. Уральской (с Усть-Уртом), Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей и в Западной Сибири в пределах, главным образом, Барнаульского окр. и Китайской Джунгарии.

По экологии несколько сходный вид с *Ch. Juncea*.

5 (28). *Ch. gummifera* Iljin sp. nov.—Х каучуконосная (карта 12).

Planta 75-150 sm alt., fere a basi ramosa, viridia vel cano — viridia, rosula leviter evoluta, emarcida: caulis plus minus robustis, basi plerumque pubescentibus et semper esetulosis, foliis inferioribus, consuetudine dentatis, marcescentibus, ceteris integerrimis, linearibus vel lanceolatis, planis, capitulis sessilibus vel breviter pedunculatis, 10—11-floriferis, involucro tenuiter pubescenti. Achaenia (excl. rostr.) 4—5,5 mm long., striata, apice coronulam squamuosam terminata, in parte




Рис. 27.

ris integerrimis, linearibus vel lanceolatis, planis, capitulis sessilibus vel breviter pedunculatis, 10—11-floriferis, involucro tenuiter pubescenti. Achaenia (excl. rostr.) 4—5,5 mm long., striata, apice coronulam squamuosam terminata, in parte

superiori insuper squamulis minoribus instructa, rostro 1,5—3 mm long., achaenio subdupo-subtriplo breviore, pappo 7—10 mm long.

Растение высокое 75—150 см высоты, выше основания разветвленное, зеленое или серовато-зеленое с крепким стеблем, внизу б. ч. с тонким сероватым пушком и всегда без щетинок в основании. Листья при корневой розетке слабо развитые, зубчатые, завядающие до цветения и схожие с самыми нижними стеблевыми, остальные стеблевые листья плоские, б. ч. цельнокрайние, от линейной до ланцетовидной формы. Корзинки 10—11-цветковые, сидячие или на коротких ножках, с оберткой тонко-серовато-пушистой или почти голой. Семянки, исключая носик, 4—5,5 мм дл., полосато-бороздчатые, на верхушке с хорошо развитой коронкой, большую частью из 5 чешуек, ниже которых располагаются отдельные чешуйки и бугорки; носик сравнительно короткий 1,5—3 мм дл., в полтора—три раза короче семянки, без сочленения или с едва намечающимся у самого основания. Летучка крупная—7—10 мм дл.

Пока известна только из Астраханского края из окр. оз. Баскунчак и Рын-Песков, из окр. Ханской Ставки, из сборов М. М. Ильина. Растет по бугристым пескам и окраинам барханов в большом количестве. Любопытно отметить, что это собственно единственный вид из этой секции, исключительно встречающийся в таких местообитаниях. Образует часто каучуконосные наплывы, как и представители секции *Brachyrhynchus*.

6 (29). *Ch. stricta* Ldb. Fl. alt. IV (1833), p. 146; Fl. Ross. II. (1844—46), p. 810: Ic. pl. fl. ross. t. 37; Крылов. Фл. Алтая III (1904), p. 743: *Ch. aspera* Poir. Encycl. Suppl. II p. 329; *Ch. Schraderi* Steud. Nom. ed. 2, II, p. 392; *Ch. aspera* Schrad in herb. X. крепкая (рис. 28, фот. 17, карта 12).—Растение 60—90 см высоты, серовато-наутилисто пушистое с очень крепким, ветвистым стеблем, внизу с жесткими




Рис. 28.

Карта № 8.

+ + + - Ch. lejosperma Kar. et Kir.

Карта № 9.

+ + + - Ch. coronifera Iljin.

Карта № 10.

● ● ● (красные) — Ch. ramosissima S. et. S.

+ + + - Ch. acantholepis Boiss. (specimina plurimque rossica) — указываются, главным образом, местонахождения в пределах С.С.С.Р.,

● ● ● (синие) — Ch. juncea L + Ch. acantholepis Boiss (specimina occidentali europaea).

Obs. На этой карточке ареалов Ch. acantholepis указывается отдельно только для территории С.С.С.Р., в остальной части (Зап. Европа) совместно с Ch. juncea, так как западно-европейские флористы часто эти виды соединяют вместе и нет возможности точно указать границы каждого из этих видов порознь; нужно думать, что Ch. acantholepis встречается узкой полосой по Средиземноморскому побережью.

Карта № 11.

+ + + - Ch. brevirostris Fisch. et Mey.


Карта № 12.

▲▲▲ — Ch. stricta Ldb.

● ● ● — Ch. gummifera Iljin.

+ + + - Ch. filifolia Iljin.

---



Карта 12.

Ареалы видов секции *Euchondrilla* Endl.