


ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ РЕЗИНОТРЕСТА

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОТДЕЛЕНИЯ
КАУЧУКОНОСОВ


М. М. Ієн.



A critical survey
of the genus
Chondrilla R.

S. 15. 1930

1930



ГОСТЕХИЗДАТ

С. 5. № 35

Б. 1930

мм дл. (весьма редко до 1 мм), с резким сочленением у зрелой семянки, по которому он опадает вместе с летучкой, равен, чуть больше или меньше куполовидной верхушки плодика. Летучка 5—7,5 мм дл.

f. setosa O. Fedtsch. листочки обертки с отдельно-рассечеными, черными щетинками.

Необходимо отметить, что присоединение этой новой формы О. Федченко к *Ch. ambigua* основано на недоразумении, так как описание *f. setosa* сделано по двум уже известным видам: вегетативные части описаны по *Ch. maracandica*, а плоды по *Ch. ambigua*. Очевидно при наклейке, по ошибке, к этому экземпляру был присоединен конвертик с семянками *Ch. ambigua*.

При описании *Ch. maracandica* у автора этого вида вкрались некоторые неточности, на которые следует указать. Они касаются, главным образом, характера семянок и количества цветов. Что касается первых, то Бунге отмечает для них не сочлененный носик—очевидно он имел дело с молодыми плодами; в отношении же количества цветов он дает цифру 12—15, превышающую действительность.

Этот вид встречается, главным образом, в Заревшанской долине: 1) р. Заревшан (Леман); 2) Рох (Комаров); 3) к. Джиджик (Комаров); 4) Гузар (О. и Б. Федченко); 5) Заалайский хр., в долине Муук-су, Суук-сай (Б. Федченко).

Растение характерное для каменистых почв и речных галечников.

5 (17). *Ch. Hookeriana* Iljin sp. nov. *Ch. graminea* Hook (non M.B.) pl. Brit. Ind. III (1882) p. 402.—Х. Гукера Planta 50—80 см alt. a basi ramosa, subglabra vel parce canescens tenuiter pubescens, foliis caulinis setaceo filiformibus, involutis, capitulis pedicellatis, involucro primo tenuiter pubescenti, mox glabrescenti. Achaenia (excl. rostr.) 4—4,5 mm long., leviter striata, esquamulosa in rostrum gradatim transcurrentia, rostro circiter 3 mm long., articulato, deciduo; pappo circiter 8 mm. long.

Растение 50—80 см высоты, от самого основания ветвистое, почти голое или с тонким пушистым налетом. Листья стеблевые узко щетиновидные, кверху направленные, несколько извитые; нижние неизвестны. Корзинки на сравнительно коротких ножках; обертка с тонким пушистым налетом, впоследствии почти голая. Семянки, за исключением носика, 4—4,5 мм дл., слегка бороздчатые, без всяких выростков и чешуек, кверху постепенно переходящие

в носик; последний около 3 мм дл. с явно развитым сочленением в нижней части, легко отделяющийся вместе с летучкой. Летучка около 8 мм дл.

Известно только из Каракорума в Западном Тибете по сборам Кларка.

Hooker в своей флоре указывает у этого вида, т.-е. *Ch. graminea* Hook:

var. *kashemiriana* Hook с более широкими листьями, встречающуюся в Кашмире. По всей вероятности это какой то другой вид, но судить заочно и лишь по краткой характеристике листьев, приводимой автором, трудно.

6 (18). *Ch. phaeoscephala* Rupr. in Osten-Sack. Sertum tiansch. Mém. l'Acad. Im. Sc. d. St. Petersb. VII ser. XIV, 4, (1869), p. 59; Fedtsch. Conspect. Fl. Turkest. IV (1911), p. 323. — X. опадающая головая (рис. 18, карта 6). —




Рис. 18.

Растения 20—50 см высоты, жестковатые, голые или внизу стебля с легким пушком, от самого основания кустисто ветвистые. Самые нижние листья продолговатые или даже лопатчатые, плоские, цельнокрайние или отставленно зубчатые, часто до цветения завядающие, все остальные стеблевые, узкие, нитевидные, более или менее свернутые на верхнюю сторону в трубку, весьма редко почти плоские, иногда по краю с отдельными шипиками, жестковатые. Корзинки на более или менее длинных ножках с черноватой или темно-оливковой оберткой, с тонким пушком или голые, иногда с отдельными щетинками (*f. setulosa* M.) или без них (*f. glabra* M.). Цветов в корзинке 10—12. Семянки, за исключением носика, 3—5 мм дл. с продольными валиками, на верхушке переходящими в зубчатую окраину; носик толстоватый и короткий, с резким сочленением, состоит из двух частей: верхней, выше сочленения, почти цилиндрической 0,4—0,8 мм дл. и нижней, за сочленением, куполовидной 0,25—0,5 мм дл., граничащей у основания с зубчатой окраиной; эти части носика часто расположены под некоторым углом, образуя дугу. Летучка 6—7 мм дл.

иногда с отдельными щетинками (*f. setulosa* M.) или без них (*f. glabra* M.). Цветов в корзинке 10—12. Семянки, за исключением носика, 3—5 мм дл. с продольными валиками, на верхушке переходящими в зубчатую окраину; носик толстоватый и короткий, с резким сочленением, состоит из двух частей: верхней, выше сочленения, почти цилиндрической 0,4—0,8 мм дл. и нижней, за сочленением, куполовидной 0,25—0,5 мм дл., граничащей у основания с зубчатой окраиной; эти части носика часто расположены под некоторым углом, образуя дугу. Летучка 6—7 мм дл.