

CCCXVI. *Chondrilla.*

878. *Ch. juncea*. Fl. t. c. II. III. n. 1588. In collibus apricis, in litore maris juxta vallem Sudak. Tataris Sakkis i. e. resina, ob usum ad masticandum.
879. *Ch. latifolia*. Fl. t. c. II. n. 1589. In valle Sudak rario. Folia rigide ciliata sed involucrum furfuraceum non setosum. Achaenia praecedentis. Eadem legi Kislariae in litore maris Caspii; armena a Szovitsio missa nonnihil diversa.
- *880. *Ch. laciniata* caule hispido ramoso superne glabro foliis radicalibus pinnatifidis et bipinnatifidis laciniis elongatis acuminatis basi latioribus, capitulis paucis spicatis involucro incano achaeniis muricatis, rostro achaenio duplo, pappo rostro parum longiore. In arena litorali vallis Laspi. Folia radicalia plus quam dodrantalia, palmam lata. Caulis 4 pedalis ramis pedem longis flores 3—4 gerentibus.

CCCXVII. *Taraxacum.*

881. *T. serotinum*. *Leontodon serotinus*. Fl. t. c. II. n. 1596. In campestribus frequens. Variat minus quam subsequens, occurrit tamen totus glaber vel caule foliisque subtus tomentosis, his integris et pinnatifidis.
882. *T. officinale*. *Leontodon Taraxacum*. Fl. t. c. II. III. n. 1595. Ubique frequens.
- *883. *T. hybernum* glabrum, foliis varie runcinatis, involueri squamis corniculatis, exterioribus adpressis, achaeniis ovatis duplo latioribus quam crassis apice muricatis rostro triplo brevioribus. 2. Circa Nikitam,