

Ch. viminalibus virgis. *Clus. hist. 2. p. 144.*

Ch. juncea septima. *Tabern. Kraeut. p. 487.*

Frequens in aruis et campis apricis. Floret Junio, Julio. ♂

1589. CHONDRILLA *latifolia.*

Ch. foliis radicalibus runcinatis: caulinis indivisis lanceolatis, caule basi calycibusque hispida.

Habitat in Tauriae campestribus, praecedente minus communis, eodem tempore florens. ♂

*Affinis praecedenti, sed diuersa habitu firmiore minus ramoso, caule ramisque foliatis, foliis latioribus et calycibus subtomentosis: squamis carinâ fetis longiusculis patentibus hispida.*

1590. CHONDRILLA *graminea.*

Ch. foliis radicalibus runcinatis: caulinis indivisis, superioribus lineari-filiformibus, caule calycibusque laevibus.

Habitat in arenâ mobili deserti Caucasio-caspici. In collibus sabulosis ad Wolgam, inter Astrachan et Zarizyn frequens. ♀

*Planta multicaulis ramosissima virgata glaberrima. Folia tantum infima subruncinata: dentibus retrospectantibus; pleraque integerrima angustissima. Calyx laevis subincanus. Corollulae laetae. Semina albida apice hispida: pappo piloso stipitato.*

396 PRENANTHES. Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus simplex, subseffilis. Flosculi simplici serie.

1591. PRENANTHES *viminea.*

Pr. foliis decurrentibus: inferioribus pinnatifidis extrorsum dentatis, summis linearibus, caule ramoso diuvaricato. *Linn.*