


ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ РЕЗИНОТРЕСТА

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОТДЕЛЕНИЯ
КАУЧУКОНОСОВ


М. М. Ієн.



A critical survey
of the genus
Chondrilla R.

S. 15. 1930

1930



ГОСТЕХИЗДАТ

С. 5. № 35

Б. 1930

Известен пока из немногих мест: 1) долина р. Тоин или р. Суукты—(Остен-Сакен); 2) долина р. Таштымага на Памире (Горбунов); 3) р. Джеген на Памире (Кушакевич); 4) у перевала Кызыл-белес, Ошского у. (Федченко и Рожевиц); 5) р. Моин в Кашгарии (Шишкин и Генина); 6) оз. Иссык-куль (Ильин и Поддубная).

По речным галечникам и каменистым местам б. ч. в субальпийской зоне.

7 (19). *Ch. ornata* Iljin sp. nov. — Х. украшенная (рис. 19, карта 7)—*Planta 30—50 sm alt. a basi ramosissima, caulis et ramis tenuiter, vix conspicue, pubescentibus, foliis setaceis, involutis, infimis oblongis vel oblongo-linearibus, sub anthesin marcescentibus, remote dentatis, dentibus plerumque linearis-attenuatis. Capitula stipitata, consuetudine 11-florifera, involucro 12—15 mm long., tenuiter pubescenti. Achaeinia (excl. rostr.) 5,5—6,5 mm long., apice coronam ex squamulis terminata et insuper in parte superiori squamulis singularibus instructa, rostro brevissimo circiter 0,75—1 mm long., maturo manifeste in media parte articulato; rappus 7—8 mm long.*

Растение 30—50 см высоты от самого основания ветвистое, с тонким пушистым налетом. Листья усиковидно-нитевидные, свернутые в трубку на верхнюю поверхность, самые нижние, обычно до цветения завядающие, продолговатые или продолговатолинейные, зубчатые, с зубцами обычно линейно-вытянутыми. Корзинки на ножках, обыкновенно 11-цветные с оберткой, с тонким пушистым налетом, темноватой, довольно крупные 12—15 мм дл. Семянки, исключая носик, 5,5—6,5 мм дл., 5-полосатые, с полосками гладкими или слабо 3-валиковатыми, на верхушке с чешуйками, образующими коронку у основания носика, ниже которой




Рис. 19.
Chrysanthemum ornata Iljin sp. nov.

иногда имеется менее развитая вторая коронка или отдельные слегка отогнутые кнаружи более мелкие чешуйки; носик весьма короткий, около 0,75—1 мм дл., с сочленением в средней части или чуть ниже, бороздчатый. Летучка 7—8 мм дл.

Известен пока только из 2 мест: 1) Кумен-Алатау, долина Иссык-куля, р. Ак-су, галечник по берегу озера 20/VII 1916, №—3220 соб. Р. Аболин; 2) оз. Иссык-куль, дресвяно-галечный берег озера по пути пос. Чомпаната — пос. Григорьевка, 1/X 1929, № 49, соб. М. М. Ильин и В. А. Поддубная-Арнольди.

8 (20). *Ch. Rouillieri* Kar. et Kir. Enum. plant. Flor. Alt. № 551, p. 88 in Bull. Soc. Im. Natur. Moscou XIV (1841), p. 456; Ldb. Fl. Ross. II, (1844—46), p. 809; Крылов. Фл. Алтая III (1904), p. 744; Fedtsch. Conspect. Fl. Turkest. IV (1911), p. 324. X. Рулиера (рис. 20, фото 5 карта 6).





Рис. 20.

сика; ниже часто расположена вторая слабо развитая коронка или же только отдельные мелкие чешуйки; носик

растения 30—75 см высоты, от самого основания кустисто-ветвистые. Стебли и ветви тонкие, по крайней мере, в самом низу с тонким беловатым пушком, иногда они почти совсем голые. Листья стеблевые тонкие, нитевидные, свернутые в трубку на верхнюю сторону и несколько извитые, б. ч. вверх направленные, самые нижние завяздающие до цветения, плоские, продолговатые или продолговато-ланцетные, б. ч. зубчатые. Корзинки на более или менее длинных ножках с голой или тонко-серовато-пушистой оберткой. Цветов в корзинке 10—11. Семянки, исключая носик, 4-5 мм дл., обычно с резко выступающими пятью продольными полосками, на которых иногда, в свою очередь, заметны по три не сильно выступающих валика; эти полоски вверху переходят в пять чешуек, образующих коронку вокруг основания носика.



Карта 7.
Распространение видов секции *Arthrorhynchus* F. et M. и секции *Euchondrilla* Endl.

ОБЪЯСНЕНИЯ К КАРТАМ.

Карта № 1.

Ареалы секций рода *Chondrilla*.

- (красная) — сек. *Euchondrilla* Endl.
- (красный) — сек. *Lagoseropsis* Iljin.
- (синяя) — сек. *Brachyrhynchus* Iljin.
- (синий) — сек. *Arthrorhynchus* Fisch. et Mey.

Карта № 2.

- Δ Δ Δ — *Ch. prenanthoides* Vill.
- ▲▲▲ — *Ch. Urumoffii* Deg.
- ● ● — *Ch. Mattfeldii* Stojan et Stef.
- + + + — *Ch. graminea* M. B.

Карта № 3.

- + + + — *Ch. ambigua* Fisch.

Карта № 4.

- ▲▲▲ — *Ch. Kossinskyi* Iljin.
- Δ Δ Δ — *Ch. sajsaensis* Iljin.
- ● ● — *Ch. Kusnezovii* Iljin.
- ||||| — *Ch. thoracifera* Iljin.
- + + + — *Ch. squamata* Iljin.

Карта № 5.

- + + + — *Ch. pauciflora* Ldb.

Карта № 6.

- Δ Δ Δ — *Ch. Rouillieri* Kar. et Kir.
- ▲▲▲ — *Ch. pectocoma* Fisch. et Mey.
- ● ● — *Ch. maracandica* Bge.
- + + + — *Ch. phaeosephala* Rupr.

Карта № 7.

- Δ Δ Δ — *Ch. pectocoma* Fisch. et Mey. subsp. *soongorica* (Stschgl) Iljin.
- ▲▲▲ — *Ch. insolens* Iljin.
- □ □ — *Ch. brevicollis* Iljin.
- ||||| — *Ch. graminea* M. B.
- ● ● — *Ch. ornata* Iljin.
- + + + — *Ch. gibbirostris* M. Pop.