

CHONDRILLA PAUCIFLORA. Tab. CXCVIII.

Ch. caule ramosissimo glabro, foliis oblongo-linearibus, floribus senis, fructibus apice subglabris, stipite pappi achenio 3-4 plo breviori, anthodio 5-phyllo.

Hab. in arenosis ad fl. Irtysch a Nabaty ad Semijarsk usque. 24 Fl. Jun. — Septemb.

Expl. Icon. CXCVIII. — a) Flos integer auctus. b) Achenium cum pappo m. a.

PEUCEDANUM PANICULATUM. Tab. CXCIX.

P. caule aphylo (a basi ad apicem) ramoso: ramis superioribus subverticillatis, foliis radicalibus cano-pubescentibus quadri-vel quintuplicato-pinnatis: pinnulis oppositis pinnatipartitis: laciniis subovatis incisis: lacinulis acutis, involucellis (♂) minutissimis.

Hab. in subsalsis deserti soongoro-kirghisici inter fl. Irtysch et montes Dolen-Kara. 24 Fl. sub medio Maji.

Expl. Icon. CXCIX. — 1. Suprema pars caulis plantae hermaphroditae. 2. Folium radicale. a) Flos masculus auctus. b) Pistillum cum calyce superstite floris hermaphroditi, petalis staminibusque jamjam delapsis, m. a. c) Carpellum a dorso spectatum auctum. d) Sectio transversalis cremocarpium aucti.

DRABA LACTEA. Tab. CC.

D. lactea. Adams in Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou V. p. 104.

D. scapis subaphyllis glaberrimis, foliis lineari-oblongis acutiusculis integerrimis pilis simplicibus ciliatis subhirtisque, petalis calyce glabro subduplo longioribus, siliculis ellipticis glaberrimis pedicello glaberrimo sublongioribus, stylo subnullo.

Hab. in alpinis humidis. 24 Fl. Jun.

Expl. Icon. CC. — a) et b) Folia a pagina inferiori, modice aucta. c) Sepalum m. a. d) Petalum m. a. e) Genitalia m. a. f) Ovarium m. a. g) Silicula m. a. h) Dissepimentum cum seminibus m. a. i) Semen m. a. k) Idem transversim sectum m. a.



Chondrilla pauciflora.