

ruthenförmig. — 1-1½'. — Auf Aeckern und Schutt, selten. — August. — ♂.

† † Mit blauen Blumen.

6. *Immerwährender L.* (*L. perennis.*) Blätter graugrün, fiederig eingeschnitten. Blumenstiele lang, schuppig. — 1'. — An felsigen, warmen Stellen, nicht überall. — Mai bis Juli. — ♀.

Die Blumen sind schön hellblau.

### Gürtellattig. (*Chondrilla.*)

Kelch gekelcht. Federkrone einfach, gestielt. Same oberhalb fünfzählig. — Kräuter mit gelben Blumen.

1. *Gemeiner G.* (*Ch. juncea.*) Wurzelblätter schrotsägezählig. Stengelblätter linienförmig, ganz. — 2-4'. — Auf Sand und unfruchtbaren Aeckern. — August. — ♀.

2. *Berglattigartiger G.* (*Ch. prenanthoides.*) Blätter graugrün, lanzett, entfernt gezähnt oder bisweilen ganzrandig. Stengel fast blattlos, ästig. — 1'. — Auf dem Sande des Rheins und seiner Nebenflüsse in Graubünden. — Sommer. — ♀.

3. *Zollikoferscher G.* (*Ch. Peltidium.*) Wurzelblätter länglich, schrotsägezählig. Stengel fast nackt. Blumenstiele und Kelch rauhaarig. — 1-1½'. — In Bergwäldern der östlichen Schweiz. — Sommer. — ♀.

### Berglattig. (*Prenanthes.*)

Kelch gekelcht, einen Kreis von Blümchen (der bei uns aus fünf Blümchen besteht) einschliessend. Federkrone einfach, sitzend oder auch gestielt.

1. *Violetter B.* (*P. purpurea.*) Blätter lanzett, graugrün, entfernt gezähnt, hinterhalb verschmälert, geöhrt. Stengel oberhalb ästig. — 3-4'. — In Bergwäldern, häufig. — Sommer. — ♀.

2. *Schmalblättriger B.* (*P. tenuifolia.*) Blätter lang, linienförmig, fast ganzrandig, geöhrt. — 1½-3'. — Auf den italiänischen Bergen. — Sommer. — ♀.

Die Blumen sind wie bei voriger Art violett oder röthlich violett, klein.

3. *Mauer-B.* (*P. muralis.*) Blätter schrotsägezählig, mit grossem, fünfeckigem Endlappen. Federkrone etwas