

phyllis linearibus, acheniis cylindrico-prismaticis striatis apice parce muriculatis ecoronulatis brevissimè et crassiuscule rostratis ②.

Hab. in lapidosis ad fluvium Sarafschan Turkestanïæ prope Samarkand (Lehm!).

Pedalis, capitula magnitudinis *C. junceæ* involucri phyllis 4 lineas longis. Inter species rostro brevissimo et pappo inde sessilibus donatas differt a *Ch. leiospermâ* capitulis multo majoribus plurifloris brevius et crassius rostratis, a *C. pauciflorâ* flosculis paucis et involucre connescenti nec glabro.

4. **C. pauciflora** (Ledeb. Fl. Alt. IV, p. 148) radice verticali, caule a basi ramosissimo ramis tenuiter virgatis elongatis flexuosis demum aphyllis, foliis radicalibus subruncinatis cito evanidis, caulinis et ramis anguste linearibus demum deciduis, capitulis terminalibus longiuscule pedunculatis cylindricis subsexfloris, calyculi basi subcarnescentis phyllis squamiformibus minimis involucri glabri linearibus, acheniis cylindrico-prismaticis striatis versus apicem coronulâ destitutum minute et parce muriculatis vel lævibus, rostro nullo vel brevissimo crassiusculo ③. Ic. Ledeb. tab. 198. — *C. ambigua* Fisch. et *C. ntybacea* Ledeb. Fl. Ross. II, p. 809 non Friv.

Hab. in desertis Turkestanïæ ad lacum Aral (Lehm.).

Ar. Geogr. Rossia austro-orientalis, Songaria, Sibiria Uralensis.

5. **C. piestocarpa**, radice verticali, caule glabro a basi ramosissimo ramis tenuiter virgatis elongatis flexuose ramulosis, foliis inferioribus...., rameis brevissimè et anguste linearibus squamuliformibus, capitulis terminalibus longe pedunculatis minutis oblongis 8-9-floris, calyculi involucre triplo brevioris phyllis anguste lanceolatis, involucri glabri linearibus obtusis, acheniis parvis compressis lineari-ellipticis striatis basi subangustioribus apice in rostrum brevissimum fragile breviter attenuatis, pappo achenio longiore ②.

Hab. in regione montanâ et alpinâ prov. Khorassan Persiæ inter Nischapur et Meschhed (Bge!), in Belutschîâ (Stocks, quantum ex specimine incompleto dijudicandum).

Dumus sesquipedalis, capitula illis *C. junceæ* breviora involucri phyllis vix 3 lineas excedentibus. Achenia cum rostro sesquilineam longa compressa quâ notâ a *C. pauciflorâ* facie affini et omnibus congeneribus distat.

HETERODERIS. — *Barckhausia* Sect. *Heteroderis* (Bge Pl. Lehm. p. 384).

Capitulum multiflorum. Involucrum calyculatum. Receptaculum nudum. Achenia biformia, radii erostria parce papposa vel epapposa, disci prismatica superne ad costas squamuloso-muricata rostro filiformi longo superata. — Herbæ annuæ pumilæ facie *Crepididis cernuæ*. — Genus a *Barckhausiâ* acheniis centralibus squamuloso-muricatis longe distans, multo magis *Chondrillæ* habitu toto, capitulis multifloris distinctæ affinis.