

Icon. *Engl. Bot. t.* 268.

In umbrosis ad sepes Græciæ. ♂.

1896. *L. virosa. Sp. Pl.* 1119.

L. sylvestris, odore viroso. *Tourn. Inst.* 473.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1957.

In agro Byzantino, *D. Sestini.* ♂.

1897. *L. saligna. Sp. Pl.* 1119.

L. sylvestris, angusto laciniato folio. *Tourn.*

Inst. 474.

Icon. *Engl. Bot. t.* 707.

Ad agrorum margines inter Smyrnam et Bursam;
etiam in monte Athô, et circa Byzantium. ♂.

1898. *L. leucophæa*, foliis oblongis acuminatis
amplexicaulibus duplicato-dentatis subrun-
cinatis, paniculâ corymbosâ.

L. orientalis altissima, sonchi folio, flore mag-
no leucophæo. *Tourn. Cor.* 35; ex cha-
râctere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 794.

In insulâ Cypro. ♂ ?

CHONDRILLA.

G. Pl. 401. *Juss.* 169. *Gærtn. t.* 158.

1899. *Ch. juncea. Linn. Sp. Pl.* 1120.

Ch. juncea viscosa arvensis, quæ prima Dios-
coridis. *Tourn. Inst.* 475.

Κόλλα Lemn.

Icon. Jacq. Austr. t. 427.

In vineis Græciæ et Archipelagi frequens; nec
non in monte Athô, et circa Byzantium. 4.
Gummi e radice colligitur hodiè in insulâ Lemno.

1900. Ch. ramosissima, foliis omnibus dentatis,
caule ramosissimo divaricato sulcato spinu-
loso.

Κονδριλλη Diosc. ? Sibth.

Icon. Fl. Græc. t. 795.

Prope Athenas. 4.

● PRENANTHES.

G. Pl. 401. Juss. 168. Gærtn. t. 158.

1901. P. viminea. Sp. Pl. 1120.

Lactuca viscosa, caule foliis obducto. Tourn.
Inst. 473.

Αγριομαρῆλι Lemn.

Icon. Jacq. Austr. t. 9.

In Cretâ, et Archipelagi insulis; etiam in monte
Athô. 3.

1902. P. muralis. Sp. Pl. 1121.

Chondrilla sonchi folio, flore luteo-pallescente.
Tourn. Inst. 475.

Θριδάξ Lacon.