

ricatis. *Hedyn. paludosa* Scop. carn. II. t. 48? *Leont. alpestre* Tsch.? *Humile depresso ex omni parte glabrum, scapi in sicco nitidi spadiceo-nigricantes, anthodia viridi-atra, ligulae subtus olivaceae.* — Auf Alpenmoor, in Ungarn auf den Zolier Alpen und in der Liptau, Lomnitzerspitze (*Hedypn. palud.*): Lang, in Tyrol: Blochmann. — Jul. Aug. 4

1799. *T. officinale* Mnch. anthodio exteriori reflexo, squamis linear-i-lanceolatis, foliis runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis, acheniis testaceis superne squamuoso-muricatis squarrosis. Engl. Bot. 510. Fl. D. 754. *Curt. Lond.* I. t. 165. Schk. t. 219. *Hayne Arzng.* II. 4. *Taraxacum Dens Leonis Desf.* Variat magnitudine foliorumque divisione, ligulae subtus lividae. — Auf Grasplätzen, an Wegen. — April—Nov. 4

CCCXLVI. Chondrilla. T. L. Knorpelsalat. Anthod. e squamis erectis aequalibus, baseos accessoriis minimis. Rec. nudum, flosc. dupli serie. Achen. apice coronato-dentata, pappo longe-stipitato piloso. — Caulis virgatus. —

1801. *Ch. juncea* L. foliis radicalibus runcinatis, rameis longissimis linearibus integris. *Jacq. a. t.* 427. *Gärtn.* 2. t. 158. f. 6. Fl. dan.

• 1652. Folia radicalia *Taraxaci*, rami longissimi, virgati, patentes, ramosi, capitula in axillis solitaria apice binate, canescentia, ligulae croceae subtus vitta sulfurea, achenii dentes supremi minus ac in seq. distincti, stipes achenium sesquilonius. — An Mauern, Schutt, auf Sandboden, geht bis Oldenburg. — Juni—Aug. ◎

1802. *Ch. acanthophylla* Borkh. foliis radicalibus sinuato-pinnatifidis, dentibus acuminatis pectinatis, rameis anguste-lanceolatis setaceo-dentatis, ramis tenuibus arrectis, ligulis concoloribus. *Ch. juncea* Schk. t. 218. Minus ramosa, rami tenuiores, flexuoso-arrecti, capitula rariora, solitaria vel apice subracemosa; anthod. basi tomentosum, ligulae croceae, achenii dentes supremi longiores in coronam coaliti, stipes achenium aequans. — Auf Sandäckern in den Rhein- und Maingegenden, in Thüringen, Sachsen, Meklenburg: Dethard. — Juni—Aug. ◎

1803. *Ch. rigens* Rchb. foliis radicalibus sinuato-dentatis, rameis lanceolatis setaceo-dentatis, ramis rigidis patent-divergentibus, ligulis

1800. *T. serotinum* (Leont.) IV. K. foliis glaucis subtus scabrosis integerrimis runcinatisve, laciniis rotundatis cartilagineo-dentatis, anthodio externo patente, acheniis testaceis fusiformibus, costis superne muricato-serratis. IV. Kit. t. 114. Planta singularis foliis durioribus subtus excoriatis, dentibus cartilagineo-eburneis, scapus plerumque totus lanatus, ligulae subtus livide-vittatae. — Auf trocknen Wiesen, Sandhügeln, auf Thonboden in Ungarn, Siebenbürgen, Mähren, bei Schwechat in der Gegend von Wien: Saut. — Juni—Nov. 4

Obs. Genus auctorum negligentiâ hucusque desolatum. Taediosa sane foliorum comparatio absque reliquis notis caute exploratis et clare expositis, tirones tam confusos reddit quam ipsi sunt Floristae. — Fructus autem non nisi in statu maturissimo observandi! —

T. L. Knorpelsalat. Anthod. e squamis erectis aequalibus, baseos accessoriis minimis. Rec. nudum, flosc. dupli serie. Achen. apice coronato-dentata, pappo longe-stipitato piloso. — Caulis virgatus. —

discoloribus. Reliquis robustior et rigidior, capitula frequentiora, in axillulis solitaria rarius bina, majora, canescentia, ligulae croceae subtus lineis tribus coccineis vittatae, achenii supremi dentes angustiores ac praecedentis nec in coronam connati sed liberi et inordinati. *Ch. latifolia* MB. ex auctore habet anthodii squamas carina setosas, qualem autem nusquam vidi, mea enim *Ch. latifolia* longe ramosior est, flexuosa, folia habet ex ovato lanceolata, anthodia cana, acheniorum coronam aequalem e squamis quinque ovatis, corollas croceas. *Ch. rigens* absque dubio hic et illic commutatur, jam enim Schk. refert, quod aliorum auct. *Ch. juncea* habeat ligulas subtus rubras. — Auf sandigen Plätzen zwischen Mainz und Bingen: Ziz; andere Standorte zu sichern. — Juni—Aug. ◎

1804. *Ch. prenanthoides* H. Cass. foliis radicalibus linearilanceolatis dentatis spathulatis, caulinis linearibus exiguis, ramis fastigiato-ramulosis. *Pren. chondrilloides* Linn. Mant. *Arduin Spec.* II. t. 17. *Lactuca* — *Scop. carn.* II. t. 49. *Spi-thamea-pedalis*, plerumque multicaulis superne fere cancellato-ramosa, glauca, corollis unicoloribus flavis, acheniorum corona patellaris repando-