

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ РЕЗИНОТРЕСТА

# БЮЛЛЕТЕНЬ ОТДЕЛЕНИЯ КАУЧУКОНОСОВ

М. М. Тейн.

A critical survey  
of the genus


Chondrilla K.

3

S. 15. 1930

1930

ГОСТЕХИЗДАТ



Сектор

С. 5. 4. 35



поверхность в трубку и на кончике назад крючковидно загнутые. Корзинки на очень длинных ножках 5—20 см дл. с оберткой из пяти листочков. Цветов 5 с трубкой венчика, довольно густо покрытой короткими вверх направленными щетинками. Летучка 7—8 мм дл. Семянки 5—6 мм дл. (без носика) с толстым коротким около 0,75—1 мм дл. носиком без сочленения, пятиполосые, с каждой полосой б. ч. слабо 3-валиковатой, в верхней части покрыты чешуйками в виде 3-зубчатых щитков и образующих на верхушке у основания носика иногда коронку, книзу постепенно исчезающими.

Собрана только один раз Б. А. Келлером в районе Зайсана в Кальджирской долине по левую сторону реки Кальджира у Карачиликского таможенного дома на песчаных буграх близ слияния р. р. Ктая и Кара-су. 14/VIII, 1908.

8 (11). *Ch. sajsanensis* Hjin sp. nov. (рис. 10, карта 4).—Х. зайсанская.—*Planta a basi ramosissima, caulibus basi sordide purpurascens et tenuiter pubescentibus, in reliquo glabris, foliis caulinis lineari-filiformibus leviter involutis, superioribus planis, capitulis 5-floriferis, acheniis 4,5-5 mm lng. striatis, basi rostri coronam dentatam formantibus, rostro 0,5-1 mm lng. crasso.*

Растение до 75 см высоты, ветвистое от самого основания, не образующее розетки листьев. Стебель в нижней части буровато-грязно-пурпуровый, паутинисто-коротко волосистый, в остальных частях растение голое. Нижние стеблевые листья при цветении завядающие; остальные жестковатые, нитевидно-линейные, отчасти свернутые на верхнюю сторону, самые верхние плоские или почти плоские линейные, почти крючковидно назад не загнутые. Корзинки на очень длинных ножках до 10 см дл. с пятью желтовато-зелеными листочками обертки. Цветов 5 с коротко волосистой трубкой венчика. Семянки 4,5—5 мм дл. с многочисленными продольными валиками с толстым носиком, едва более узким, чем сама семянка 0,5—1 мм дл., окруженным у своего осно-




Рис. 10.

вания кольцом зубчиков, составляющих продолжение валиков семянки; ниже этого венца имеется часто на продолжении валиков 'вверху семянки несколько рассеянных зубчико-видных чешуек. Летучка 7,5—9,5 мм дл.

Встречается только в Зайсане. В настоящее время собрана только в двух местах: 1) окр. Бурана, около устья р. Алкабека, близ р. Китайки и 2) между Хуторами и Бураном. В обоих случаях собрана П. Н. Крыловым и Л. Сергиевской в 1928 г.





Рис. 11.

9 (12) Ch. Kusnezovii Iljin sp. nov. — X. Кузнецова (рис. 11, карта 4). Planta a basi ramosissima, rosulam non formantia, opaca, ramis in parte inferiori et foliis primo tenuiter pubescentibus, mox abstersibilibus; foliis caulinis lineari—filiformibus, fere cylindricis, involutis, apice hamate recurvatis; capitulis p. m. longe pedunculatis, 9—11-floriferis; achaeniis 7—8 mm lng. apice squamis thoraciformibus dentatis appressis obtectis, rostro brevi, 0,5—1 mm lng., non articulado.

Растение кустисто—ветвистое от самого основания, несколько матовое, чем отличается от всех других видов этой секции, с основаниями ветвей и отчасти листьями тонко пушистыми, впоследствии голыми. Листья узкие, линейно-нитевидные, свернутые в трубку на верхнюю сторону, на верхушке крючковидно назад загнутые. Корзинки на более или менее длинных ножках с внутренним рядом обертки из 7—9 листочков. Цветов 9—11 с трубкой венчика, покрытой густо короткими, вверх направленными, щетин-



Карта 4





Распространение видов секц. *Brachytrichynchus* Iljin















## ОБЪЯСНЕНИЯ К КАРТАМ.

### Карта № 1.

*Ареалы секций рода Chondrilla.*

-  (красная) — сек. Euchondrilla Endl.  
 (красный) — сек. Lagoseropsis Iljin.  
 (синяя) — сек. Brachyrhynchus Iljin.  
 (синий) — сек. Arthrorhynchus Fisch. et Mey.
















### Карта № 2.

-    — Ch. prenanthoides Vill.  
   — Ch. Urumoffii Deg.  
   — Ch. Mattfeldii Stojan et Stef.  
   — Ch. graminea M. B.




### Карта № 3.

-    — Ch. ambigua Fisch.













### Карта № 4.

-    — Ch. Kossinskyi Iljin.  
   — Ch. sajsanensis Iljin.  
   — Ch. Kusnezovii Iljin.  
   — Ch. thoracifera Iljin.  
   — Ch. squamata Iljin.



















### Карта № 5.

-    — Ch. pauciflora Ldb.

### Карта № 6.

-    — Ch. Rouillieri Kar. et Kir.  
   — Ch. piptocoma Fisch. et Mey.  
   — Ch. maracandica Bge.  
   — Ch. phaeocephala Rupr.

### Карта № 7.

-    — Ch. piptocoma Fisch. et Mey subsp. soongorica (Stschgl) Iljin.  
   — Ch. insolens Iljin.  
   — Ch. brevicollis Iljin.  
   — Ch. graminea M. B.  
   — Ch. ornata Iljin.  
   — Ch. gibbistrotris M. Pop.