

87. Toutes les semences à aigrette de poils.

Condrille. *Chondrilla*.

Les Condrilles ne diffèrent des lampfanes que par leurs semences chargées d'aigrettes persistantes & très-sensibles. Les calices sont légèrement caliculés; les fleurs sont fort petites.

ANALYSE.

Huit fleurettes ou moins
dans chaque fleur.

I.

Plus de huit fleurettes
dans chaque fleur.

VI.

I. Huit fleurettes ou moins dans chaque fleur.

Fleurs presque sessiles & très-
rapprochées de la tige.

II.

Fleurs pédonculées
& disposées en panicule.

III.

II. Fleurs presque sessiles, & très-rapprochées
de la tige.

Condrille sessiliflore. *Chondrilla sessiliflora*.

Lactuca viscosa caule foliis obducto. Tournef. 473.

Prenanthes viminea. Lin. Sp. 1120.

Ses tiges s'élèvent presque jusqu'à deux pieds; elles sont branchues, grêles, cylindriques, glabres & enduites d'une gomme visqueuse & collante: ses feuilles inférieures sont grandes, lisses, profondément pinnatifides, & leurs pinnules terminales sont élargies & anguleuses; les supérieures sont simples, petites & collées sur les tiges. Les fleurs sont jaunes, disposées le long des tiges & des rameaux; les calices sont alongés, presque embriqués, & les semences sont longues & rougeâtres. Cette plante croît dans les lieux pierreux & sur le bord des vignes dans les provinces méridionales. ¶