

rarius integra vel circacircum leviter dentata, plerumque basi profunde dentata vel potius lyrato-pinnatifida; *caulina* fere omnia linearia, integrifolia, sessilia, rarius unum alterumve radicalibus quoad formam simile, sed multo minus in inferiore caulis parte observatur. Flores corymbosi vel potius ramulos elongatos fastigiatos terminantes. Anthodium glabrum: foliolis omnibus simplicibus, i. e. nec ciliato-barbatis, nec corniculo auctis.

Haec var. *altaica* cum forma multicauli speciei antecedentis habitu non parum convenit, optime tamen dignoscitur colore totius herbae e nigricante viridi maxime glauco, floribus multo minoribus, corollulis in quovis anthodio paucioribus, anthodii foliolis omnibus glaberrimis, apice simplicibus, nec ciliato-barbatis, nec infra apicem corniculatis. Achenia insuper in hac specie versus apicem attenuata sunt, ita ut pappus stipitatus videatur, quod in P. diversifolia nunquam observatur.

An Gmel. l. c. f. 1. potius ad speciem antecedentem? — utrum diversa species hucusque ignota?

407. CHONDRILLA. LINN. (L.)

LINN. gen. pl. ed. SCHREB. II. p. 528. No. 1235. — GAERTN. II. p. 362. t. CLVIII. f. 7. — LAM. ill. t. 650. f. 1. 2. — SCHKUHR t. CCXVIII.

Anthodium oligophyllum, cylindricum, calyculatum, pauciflorum. Receptaculum nudum. Pappus pilosus, longe stipitatus: stipite basi squamu-lis paleaceis obvallato.

1. CHONDRILLA STRICTA. m.

Ch. caule basi hispido ramoso, foliis radicalibus obovato-runcinatis glabris; caulinis rameisque ovato-oblongis lanceolatisve integrifloris denticulatisve, ramis anthodiisque arachnoideo-tomentosis.

Ch. stricta. Ledeb. Ic. pl. Fl. ross. alt. illustr. t. 37.

Chondrilla. *Gmel. Fl. sib. II. p. 8. No. 6. (excl. syn. omn.)*

Hab. in collibus apricis prope pagum Sogra (L.). Fl. Aug. 24.

Caulis 2—3-pedalis, erectus, strictus, rigidus, parum supra basin ad apicem usque ramis cauli similibus instructus, basi setis longis hispidis et insuper per totam longitudinem, praesertim vero apicem versus arachnoideo-tomentosus; florendi tempore inferne foliis emarcidis aphyllus, superne satis dense foliosus. Folia crassiuscula, rigida; *radicalia* obovata runcinata, basi attenuata, 5—6 pollices longa, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. lata, glabra, glaucescentia vel potius pulvere aut pube tenuissima facile abstergibili tecta; *caulina inferiora* in planta juniori radicalibus similia, demum emarcida, quo magis a caulis basi remota sunt, eo magis integra et basin versus dilatata videntur; *media* ovato-oblonga, infra medium setis crassis subcartilagineis ciliata; *suprema* et *ramea* ovato-lanceolata vel oblonga, integerrima vel leviter dentata. Anthodii *foliola* tomento tenui albicante obtecta, minime vero hispida. Flosculi 10—12. Achenia apice muricata. Pappus pro more generis stipitatus: *stipite* pappo 3—4-plo breviori.

Succus resinoso-gummosus, quo tota planta scatet, ex inferiori caulis parte guttularum ad instar variae magnitudinis exsudatur.

Affinis Ch. latifoliae M. a Bieb., quae differt anthodii foliolis carina setis longiusculis patentibus, in nostra plane deficientibus, hispidis.

Synonymon *Gmel.* huc potius spectare videtur, quam ad Ch. junceam.

2. CHONDRILLA JUNCEA. Linn.

Ch. caule basi hispido ramosissimo, foliis radicalibus runcinatis; caulinis oblongo-linearibus integerrimis ramisque glabris, anthodiis glabriusculis, floribus subundenis (9—11), acheniis apice muricatis.