

1. *H. GLABRA* (L. sp. 1140.) caule ramoso glabro aphylo, *ligulis involucrum aequantibus, acheniis centralibus longe rostratis, marginalibus rostro destitutis.* ○ In agris praecipue arenosis. Jul. Aug. Schk. t. 225.

Sect. II. *ACHYROPHORUS* Scop. carn. 2. 321. Achenia omnia longe rostrata.

2. *H. BALBISII* (Lois. not. 124.) caule ramoso glabro aphylo, *ligulis involucrum aequantibus, acheniis omnibus longe rostratis.* ○ In pascuis arenosis, (ich besitze ein Exemplar, welches Hr. Apoth. Mavors bei Bassinghausen in d. Gegend v. Hanover gesammelt hat.) Jul. Aug. *H. minima* Balb. misc. alt. 29. — *H. Balbisii* Reichenb. fl. exc. p. 268., excl. synon. Richt. et Jacq. — Similima *Hypochoeridi glabrae*, nec differt nisi acheniis, etiam marginalibus, longe rostratis; an igitur varietas? — *H. intermedia* Richter. flor. lips., saltem specimen in *Reichenbachii* herb. flor. germ. n. 38., non differt ab *H. radicata*, nam e semine maturo speciminis memorati hanc eduxi.

3. *H. RADICATA* (L. sp. 1140.) *caule ramoso glabro aphylo, ligulis involucro longioribus, acheniis omnibus longe rostratis.* 24. In pratis, pascuis, ad sylvarum oras. Jul. Aug. Fl. d. t. 150. *Achyrophorus radicatus* Scop. carn. 2. p. 117. „In nonnullis floribus (capitulis) paleae subinde omnino deficiunt“ Gaud. fl. helv. 5. p. 149. E tali specimine *Scorzonera taraxacifolia* Jacq. ic. rar. t. 160 ortum duxit.

4. *H. MACULATA* (L. sp. 1140.) *caule 1-3 cephalo subunifolio hispido, pedunculis subaequalibus, foliolis involucri margine integris, intermediis apice tomentoso-marginatis.* 24. In pascuis sylvaticis, collibus lapidosis, virgultis, ericetis, (stellenweise durch d. g. Gebiet.) Jul. Aug. Hayn. arzng. 6. t. 43. Variat foliis fusco-maculatis et immaculatis.

5. *H. UNIFLORA* (Vill. prosp. fl. delph. p. 37.) *caule 1 cephalo hispido superne sensim incrassato subclavato basi foliato, foliolis involucri exterioribus et intermediis margine lacero-fimbriatis.* 24. In pascuis alpium et reg. subalpinarum, (Schweiz u. dch die ganze Alpenkette bis nach Oestreich u. Krain, sodann auf d. höchsten Bergkuppen v. Mähren, Böhmen u. Schlesien; auf d. Feldberge in Baden.) Jul. Aug. *H. helvetica* Jacq. ic. rar. t. 165.

Trib. XXI. *CHONDRILLEAE.* Pappus pilosus, radiis capillaribus basi non latioribus. Receptaculum nudum. Achenium rostratum, rostro basi coronula prominente vel muricibus squamiformibus cincto.

79. *WILLEMETIA* (Necker. elem. 1. 50.) Involucrum imbricatum, subcalyculatum. Flores multiseriales. Achenium apice coronula crenulata, rostri elongati filiformis basin cingente. Pappus pilosus. Receptaculum nudum.

1. *W. APARGIOIDES* (Cassin. dict. d. sc. nat. 48. p. 427.) 24. In pratis et sylvis alpinis et subalpinis; in planities, alpes comitantes, hinc inde descendens. Jul. Aug. *W. hieracioides* Monn. ess. p. 80.