

*moso-spicata*. Flores lutei. Differt à Soncho et à Pieridio achæniis apice attenuato-rostratis, à Microrhyncho achæniis non angulatis, à Phænopo numero florum.

1. B. INTYBACEUS, caule tereti lœvi apice laxè paniculato, foliis runcinatis dentato-ciliatis obtusis amplexicaulibus sagittatis, radicalibus obovatis, capitulis secus ramos remotis solitariis pedicellatis cylindraceis. (1) ad vias in ins. Sancti-Thomasii (Less.). *Lactuca intybacea* Jacq. ic. rar. 1. t. 162. coll. 1. p. 53. Less. in linnæâ 1831. p. 721. *Phænixopus intybaceus* Less. syn. 137. *Cicerbita intybacea* Wallr. sched. p. 435. Invol. ex icon. videtur subsimplex. Flores sulphurei. Pappus in descr. Jacq. dicitur sessilis, ex Less. potius breviter stipitatus et achænia transversè rugulosa. Capitula 14-flora.
2. B. CARIBÆUS, glaber, caule erecto nudo parcè ramoso, foliis radicalibus subsessilibus basi attenuatis oblongis acuminatis runcinatis ciliato-serratis, capitulis secùs ramos remotè spicato-racemosis geminis, pedicellis squamellosis. — in Guadalupâ legit cl. Bertero! et in Porto-Ricco cl. Wydler. *Sonchus taraxacifolius* è Guadalupâ ortus Spreng.! syst. 3. p. 649. excl. syn. Achænia breviter rostrata submuricata. Species B. intybaceo affinis. (v. s.)
3. B. GORÆENSIS, glaber subglaucescens, caule erecto nudinculo apice-ramoso, foliis runcinatis ciliato-spinulosis, capitulis secùs ramos paucis racemoso-spicatis, pedicellis brevibus squamosis. (1) in insulâ Afric. occid. Gorée (Lam.), in Senegambiae regione Walo locis inundatis ad fl. Senegal (Perr.). *Sonchus Goræensis* Lam. dict. 3. p. 367. Willd. sp. 3. p. 1514. *Sonchus ciliatus* Perr.! in litt. Achænia muriculata breviter rostrata. (v. s.)
4. B. OBTUSUS (DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 96), glaber glaucus, caulis pluribus erectis dichotomis subnudis, foliis radicalibus oblongis obtusis ciliato-spinulosis obtusè runcinatis, caulinis paneis acutius lobulatis, capitulis spicato-racemosis. (2)? in Indiâ orient. ad Sahedgunj legit cl. Hamilton. *Prenanthes obtusa* Ham.! herb. Wall.! cat. comp. n. 186. Folia rad. basi attenuata non verè petiolata. Achænia lœviuscula brevissimè rostrata, ex statu immaturo judicata. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
5. B. SONCHIFOLIUS, glaber, caule erecto basi folioso apice nudo parcè ramoso, foliis membranaceis amplexicanibus obovatis sinuato-subruncinatis margine setoso-ciliatis, capitulis secùs ramos remotè spicato-racemosis, pedicellis brevissimis subsquamosis. (1) in Indiâ peninsulâ frequens (Wight!). *Cacalia sonchifolia* Wall. cat. n. 3144. var. D. *Lactuca remotiflora* DC. in Wight contrib. p. 26. Achænia oblonga subcompressa transversè muriculata in rostrum breve attenuata. Pappus albus mollis. (v. s.)
6. B. TARAXACOIDES, glaber, caule erecto striato apice paniculato, foliis infer..., super. hastato-amplexicanibus acuminatissimis grossè et acutè inciso-serratis, capitulis geminis ternis breviter pedicellatis secùs ramos remotè spicato-racemosis, bracteis bracteolatisque parvis subscariosis. — in Indiâ orientali legit cl. Russel. *Prenanthes taraxacoides* Wall. cat. comp. n. 389. Caulis bas. crassus fistulosus. Achænia oblonga in rostrum breve attenuata muriculata. Pappus albus mollissimus. (v. s. in herb. cœt. mere. angl. Ind. or.)

CCCCXXX. CHORISIS. — *Chorisma Don* in linnæâ 1830. litt. p. 141. non Lindl. — *Prenanthis* sp. Linn.

Capit. 10-12-florum. Invol. 8-10-phylum basi calyculatum, squamis scariosis. Recept. nudum. Achænia subfusiformia compressa sulcata glabra apice attenuata, disco epigyno dilatato. Pappus mollis fugax triserialis. — Herba boreali-Asiatica repens glabra. Folia radicalia petiolata tripartita, lobis lateralibus bi-, medio trilobulato, caulinis pauca lanceolata dentata. Capitula 1-3 ad apicem caulis. Flores coerulei. — Chorisid idem sonat ac Chorisma. — Genus mihi caracteribus subdu-  
biū sed ex habitu distinctissimum.