

num dictum, quod in hac semiosculosorum familia naturali eo rectius statuitur eoque magis necessarium est, quo gravius quaedam species inter utrumque vacillant et ab his auctoribus ad Sonchos, ab alijs ad Lactucas aequo jure relatae sunt. Et calycis indoles et seminum pappique disco stipitate interi proprietates, in his plantis gravissimi momenti, distinctionem luadent atque vindicant. Quod Barkhäusius inter Crépidem et Hieracium: id Cicorbита nostra inter Sonchum et Lactucam. Omnes species quadam habitus naturalis communiōe congregantur.

Hujus generis sunt: 1) CICORBITA MACROPHYLLA Wallr. (Sonchus Willd.). — 2) CIC. BOERHALIS W. (Sonchus lapponicus Froehl.). — 3) CIC. LEUCOPHAEA W. (Sonchus W.). — 4) CIC. FLORIDANA W. (Sonchus L. Lactuca Boerh.). — 5) CIC. ACUMINATA W. (Sonchus W. Lact. villosa Jacq.) — 6) CIC. CANADENSIS W. (S. pallidus W. Lact. canad. L.). — 7) CIC. INTYBACEA W. (Lactuca Jacq.). — 8) CIC. ELONGATA W. (Lactuca Mühl. Lexb.).

Hae et quaedam aliae exoticae: ex indigenia sunt:

357. CICORBITA ALPINA Wallr. f. Sonchus alpinus. Hudf. Spr. hal. 224. synonym. add. Hieracium coeruleum Scopol. carn. n. 976. S. laevior australis Hl. coeruleo flore Clus. hist. II. 147. f. 1. S. coeruleus latifolius Chabr. stirp. 316. f. 6. Intybus platyphyllos hercyn. Thal. henc. 62. → Rarissime occurrit inter Schmon et Wendelstein: frequentius in hercynicis.

358. CICORBITA CORYMBOSA Wallr. foliis inferioribus lyrato-runcinatis basi amplexicauli

cell. Empir. c. 8. adleverat. Cf. Reinesf. ad Petro n. fragm. p. 95.

attenuatis, caulinis runcinato-pinnatifidis basi foliacea sagittatis, summis linearibus sensim minoribus, corymbo ramofissimo.

*Lactuca stricta* *Waldst. et Kit. hung. J.*  
47. t. 48. opt.

*L. quercina* *Spr. hal. 225. et al. auct. fl. germ. nec Linn.*

In dumetis der Steinklippe, in nemoribus caeduis ad Rosleben satis vulgaris.

Radix biennis, napiformis, fibras aliquot emittens, fusca. Caulis solitarius ex eadem radice, simplicissimus, strictus, teres, striatus, laevis, foliosus, 2 — 4-pedalis. Folia utrinque glaberrima, tenera, venosa, pallide viridia, subrus pallidiora: radicalia petiolata, obtusa, varia; caulibus inferiora lyrato-runcinata, laciniis oblongis lubidiformibus sinuato-dentatis, extrema majori irregulariter triangulari in petiolum laciniis sensim minoribus exstructum, amplexicaulem attenuata, caulina superiora pinnatifido-laciniata, laciniis omnibus sublanceolatis acuminatis sinuato-arguteque dentatis, aliis minoribus simul interjectis, basin sagittatam versus amplius dilatata (petiolus foliaceus), auriculis denticulatis porrectis: lumina e basi dilatata linearia, integerrima. Flores corymbosi, fastigiati: ramuli floriferi, teretes, infra calyces aliquot foliolis brevissimis tecti, demum patentissimi. Calyces oblongi, basi ovati, foliolis inaequalibus, exterioribus minoribus, dorso purpureo maculatis. Corolla flava utrinque concolor. Semina oblonga, compressa, striata, atra, in stipitem pappophorum rigidum, concolorem attenuata, apicem versus alpera. Pappus disco inferus, seminibus brevior.

Variat foliis caulinis basi latioribus laciniisque angustioribus.

*Lactuca quercina* *L. (Cicerbita)* ex insula Carolina maris baltici, a nostra, radice perenni,

floribus paniculatis, strictis, foliis basi dilatatis et aliis notis differt. Nullas video differentias inter Cicerb. nostram et Lactucam strictam. *K.* nomen triviale tamen retinere nolui, quoniam plurimis Cicerbitis caules erecti communes sunt.

359. CICERBITA MURALIS *Wallr.* foliis lyrato-runcinatis, laciniis lateralibus in basin obliquatis terminalique majore basi cordata subtriangularibus sinuato-dentatis, calycibus cylindricis calyculatis quinquefloris, panicula patentissima.

*Prenanthes muralis L. et auct.*

Veteres Cicerbitam nostram *Sonsho: Gaertnerus, Tamarckius et Candollius, Chondrilla: Linnæus* *Prenanthe* generi suo et de quo inquirendo adscripsit, omnibus tamen locis hanc a reliquis speciebus, pappo stipitato alienam esse, admonuit. Hinc *Gaertnerus*, qui omnia genera accuratissime indagavit, in iconibus Lactucam dixit. Equidem seminum pappique indolem pro generis nota habeo essentiali. Florum numerus enim æque ac calycis forma ambiguitatem producit, ut ex *Artemisiae monogynæ Kit.* et *Artemisialis Lam.* aliarumque exemplis patet. Quod *Hieracium præmorsum* inter reliqua *Hieracia*; id *Prenanthes muralis* inter *Cicerbitas*, quæ ex *Corollistarum* systemate in nostrum transit. Habitus denique occulte consulendus isque usu neque institutione neque disciplina addiscitur.

## LX. BARKHAUSIA *Moench.*

(*Gaertn. t. 158.*)

Calyx ovalis e foliolis æqualibus dorso gibbosis polyphyllus; basi calyculatus, effoetus demum costato-torulolus. Receptaculum nullum. Semina in