

А. И. ЛЕСКОВ

НОВЫЙ ВИД РОДА *CICERBITA* WALL.

*Cicerbita Olgae* mihi sp. nova.

Sect. *Lactucopsis* (Schultz) Beauverd.<sup>1</sup>

Radix praemorsa. Caulis 70—90 cm altus rectus fistulosus, glaber vel inferne pilosus, superne in paniculam ovatam simplicem oligocephalam abiens. Folia omnia tenera petiolata subtus caesia, petioli et nervi foliorum subtus pilosi. Folia inferiora pinnatisecta, lobis terminalibus majoribus cacaliaeformibus, 19 cm latis et 16 cm longis, irregulariter acute dentatis, lateralibus inaequalibus utrinque 1—2 oblongis basi lata rachidi insidentibus. Petioli foliorum elongati basi versus sensim dilatati. Folia superiora cacaliaeformia 17 cm lata et 14 cm longa irregulariter grosse et acute dentata, petioli lato-alati, basi auriculati amplissimi grosse dentati.

Bractee parvae squamaeformes. Capitula breviter pedunculata cylindrica 10—12 mm longa et 3—4 mm lata, 8—10 flora. Involucri phylla glabra exteriora angusta ovata interioribus linearibus dimidio breviora. Flosculi lutei. Achenia brunnea 8 mm longa elliptico-linearia compressa utrinque 7—9 costata scabrida in rostrum brevissimum albidum disco terminatum attenuata. Pappus albus achenio aequalis vel paulo longior.

Caucasus occidentalis, district. Maikop. Abiegnum ad fl. Kischa prope mont. Aspidnaja. 4 VIII 1930 Fl. et fr.

Многолетник. Стебель слабо бороздчатый, полый, 70—90 см высоты, голый или в нижней части слабо волосистый. Все листья черешковые, нежные, сверху темнозеленые, снизу сизые и по жилкам волосистые. Нижние листья до основания перисто-рассеченные. Конечная доля копьевидная, 19 см ширины и 16 см длины, по краю неправильно и крупно острозубчатая. Боковые доли неравные в числе 1—2 пар, с широким основанием, сидящие на оси под углом в 40—45°. Черешки нижних

<sup>1</sup> G. Beauverd. Contribution à l'étude des Composées (suite III). Le genre *Cicerbita* 1910. (Bull. de la Société Botanique de Genève, p. 99, 145).



*Cicerbita Olgaе mihi* sp. nova. А — общий облик; а — корзинка; б — цветок; в — семянка; г — верхний конец семени с диском.

листьев слегка желобчатые, постепенно к основанию расширенные. Верхние листья копьевидные. Пластинка их 17 см ширины и 14 см длины. По краю неправильные и острозубчатые. Черешки ширококрылатые с крупными стеблеобъемлющими ушками при основании. Соцветие редкая, немного-цветковая овальная метелка. Прицветники зеленые чешуевидные. Корзинки цилиндрические 10—12 см длины, 3—4 см ширины, 8—10 цветковые. Наружные листки обертки яйцевидные, вдвое короче внутренних линейных. Цветки желтые почти вдвое длиннее оберток. Семянки узко-эллиптические, коричневые, 8 мм длины, плоские, с обеих сторон с 7—9 ребрышками, по ребрышкам шероховатые, на конце вытянутые в очень короткий носик, заканчивающийся диском с хохолком. Хохолок белый двурядный; наружные волоски во много раз короче внутренних.

Северный Кавказ. Майкопский округ. Пихтовый лес, по склону горы Аспидной к реке Кеше. 3 VIII 1930 г. Цв., пл.

---

Среди всех видов секции *Lactucopsis*, описываемый здесь новый вид выделяется копьевидными листьями, напоминающими листья *Prenanthes calahaefolium* (M. B.) Beauverd. По строению цветов, плодов и корзинок наша *Cicerbita* почти не отличима от *C. deltoidea* (M. B.) Beauverd. Несомненно, что столь большое морфологическое сходство вызвано их генетической близостью. Близость эта так велика, что не исключена возможность происхождения их от одного, общего обобщенного вида, предка.

---