

XXIX (1964) 266 p.p. (non Beauverd). — *Cicerbita sevanensis* Kirp. Мат. Герб. Бот. инст. АН СССР XXII (1963) 304 и Фл. СССР XXIX (1964) 362.

II.

Следует выяснить вопрос, как называть растение, до настоящего времени большинством кавказских исследователей принимаемое за *Cicerbita cacaliaefolia* (M. B.) Grossh.; Бовером (Beauverd 1910, 1911) же, А. И. Лесковым (1932) и М. Э. Кирпичниковым (1964) — за *Prenanthes cacaliaefolia* (M. B.) Beauv.

В 1843 году Кох (Koch, 1843) с высокогорий Кавказа и Рачи („in alpinis Caucasiceis et in Nakerala abundat“, l. c. p. 279) описал новое растение под названием *Mulgedium petiolatum*. Сравнение с первоописанием этого вида и всестороннее изучение кавказского материала из этого цикла показывает, что растения, относимые кавказскими исследователями к *C. cacaliaefolia* (M. B.) Grossh. и *Pr. cacaliaefolia* (M. B.) Beauv., следует именовать *Cicerbita petiolata* (C. Koch) Gagnidze comb. nov.

Морфологические признаки, приводимые Кохом для выделения вида *M. petiolatum* (крупные сердцевидно-копьевидные листья с длинными черешками, которые у основания образуют влагалище и иногда снабжены двумя противорасположенными узкими сегментами или зубцами, а также, грязновато-желтоватый хохолок) из современных кавказских представителей р. *Cicerbita* с голубым венчиком свойственны именно растению, которое определялось как *C. cacaliaefolia* и *Pr. cacaliaefolia*.

Кавказско-лазистанское растение *M. petiolatum*, описанное Кохом по совокупности признаков (железистое опушение всего растения; общая форма листочков обертки корзинок; сплюснутые семечки с заметно выраженными ребрами, а иногда коротким и толстым носиком на верхушке; общая форма листьев, и наконец габитус всего растения), выявляет общность с представителями рода *Cicerbita*, что и дает основание отнести это растение к р. *Cicerbita* под названием *C. petiolata* (C. Koch) Gagnidze.

Ниже приводим принятую нами синонимику для вида *C. petiolata*.

Cicerbita petiolata (C. Koch) Gagnidze comb. nov. — *Mulgedium petiolatum* C. Koch in Linnaea 17 (1843) 279. — *Mulgedium cacaliaefolium* (non (DC.) Ledeb. Fl. Ross. II, 2 (1845 — 46) 841 p.p. — *Prenanthes cacaliaefolia* M. B.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Geneve 2 ser. II (1910) 114 et 115; Кирпичников во Фл. СССР XXIX (1964) 266. — *Cicerbita cacaliaefolia* (M. B.) Grossh. Фл. Кавк. изд. 1, IV (1934) 253 и Опр. раст. Кавк. (1949) 514 p. min. p.

C. petiolata по строению семян четко отграничена от всех кавказских представителей секций *Prenanthopsis* Kirp., *Platyachenia* Kirp., *Multicostaria* Kirp. рода *Cicerbita*. Мы выделяем *C. petiolata* в особую секцию *Petiolata* Gagnidze, описание которой приводится ниже.

Sectio Petiolata Gagnidze sect. nov.

Folia longipetiolata. Achenia bruneola, plus minusve complanata, costulis longitudinalibus uno-paucis ab utroque latere praedita. Achenium apice in collum breve angustatum. Pappus rufulus uniserialis rarius biserialis, setis exterioribus vix conspicuis.

Типус sectionis — *Cicerbita petiolata* (C. Koch) Gagnidze.

Листья длинно-черешчатые. Семянки светло-коричневатые, б. м. сплюснутые, снабженные с каждой стороны одним или несколькими продольными ребрышками. На верхушке семянка сужена в виде короткого горлышка. Хохолок рыжеватый, однорядный, изредка двурядный. В последнем случае наружный круг хохолка развит слабо и едва заметен.

Тип секции — *Cicerbita petiolata* (C. Koch) Gagnidze.

В настоящее время к этой секции, кроме *C. petiolata* из кавказских представителей рода *Cicerbita*, относится также кавказско-лазистанский вид *C. pontica* (Boiss.) Grossh.

რ. ბ ა ბ ე ი ძ ე

სახეობა SONCHUS CACALIAEFOLIUS M. B.-ის შემცნობისათვის

ლენინგრადის ბოტანიკის ინსტიტუტში დაცული მარშალ ბიბერშტეინის საპერბარიუმო მასალების შესწავლის საფუძველზე ავტორი ასკვნის, რომ მცენარე, რომელიც მარშალ ბიბერშტეინმა აღწერა საქართველოდან 1808 წ. *Sonchus cacaliaefolius* სახელწოდებით, არასწორად იყო შეცნობილი კავკასიის მკვლევართა მიერ. ამის შედეგად, *S. cacaliaefolius* M. B.-ის შესაბამისი ნომენკლატურული კომბინაციებით (*Mulgedium cacaliaefolium* DC., *Prenanthes cacaliaefolia* (M. B.) Beauv., *Cicerbita cacaliaefolia* (M. B.) Grossh.) შეცდომით მოხსენიებული იყო სრულიად სხვა, კავკასია-ლაზისტანის მცენარე *Mulgedium petiolatum* C. Koch.

ავტორი ასკვნის, რომ სახეობები *S. cacaliaefolius* M. B. და *Cicerbita macrophylla* (Willd.) Wallr. იდენტურია. მარშალ ბიბერშტეინის სახეობას ავტორი *C. macrophylla*-ს სინონიმიკაში იხილავს, რადგანაც ეს უკანასკნელი უფრო ადრე იყო აღწერილი ვილდენოვის (Willdenow, 1803) მიერ *Sonchus macrophyllus*-ის სახელწოდებით.

რაც შეეხება კობის სახეობა *M. petiolatum* C. Koch-ს, იგი ავტორს მოჰყავს *Cicerbita petiolata* (C. Koch) Gagnidze comb. n.-ს სახელწოდებით ამ სახეობის ნიშანთა საფუძველზე გამოყოფს გვარ *Cicerbita*-ს ახალ სექციას — Sect. *Petiolata* Gagn. შრომაში მოცემულია *C. petiolata* და *C. macrophylla* — სთვის მიღებული ნომენკლატურა.

ЛИТЕРАТУРА — ლ ი ბ ე რ ა ტ უ რ ა

1. А. А. Гроссгейм. Флора Кавказа. I-ое изд. т. IV, 1934, Баку.
2. А. А. Гроссгейм. Определитель растений Кавказа, 1949, Москва.
3. М. Э. Кирпичников. К познанию отечественных видов родов *Cicerbita*