

rum) longorum tenuium solitaria. Achenia pallida, rostro brevi obscuro terminata.

Typus sectionis — *Cephalorrhynchus polycladus* (Boiss.) Kirp.

CICERBITA Wallr.

359 55. Subgen. II. **Platyachena** Kirp. subgen. nov. — Achenia lanceolata vel lineari-elliptica, plus minusve compressa ad plana vel complanato-triangularia, saepissime atro-violacea, costulis longitudinalibus plus minusve numerosis, rarius uno-paucis ab utroque latere praedita, per totam superficiem pilis brevissimis, haud raro in seriebus transverse undulatis dispositis vestita, apice in collum latum attenuata.

Typus subgeneris — *Cicerbita uralensis* Beauverd.

Nomen subgeneris ob formam achenii datum.

56. Sectio 1. **Platyachena** Kirp. sect. nov. — Achenia plus minusve compressa vel complanato-triangularia, ab uno saltem latere costa longitudinali mediali bene conspicua praedita, per totam superficiem pilis brevissimis (sub lente!) in seriebus transverse undulatis dispositis tecta.

Typus sectionis — typus subgeneris.

57. Sectio 2. **Prenanthopsis** Kirp. sect. nov. — Achenia compressae triangulari vel valde compressa ad plana, costulis longitudinalibus numerosis plus minusve aequalibus praedita.

Typus sectionis — *Cicerbita prenanthoides* (M. B.) Beauverd.

58. Sectio 3. **Multicostaria** Kirp. sect. nov. — Achenia plana saepe vix asymmetrica, costulis longitudinalibus subaequalibus numerosis praedita, apice angustata, quasi collum formantia. Pappus exterior optime evolutus (qua nota a ceteris speciebus subgeneris *Platyachena* differt).

Typus sectionis — *Cicerbita deltoidea* (M. B.) Beauverd.

59. Subgen. III. **Poicilachena** Kirp. subgen. nov. — Achenia anguste vel oblongo-elliptica, ochracea vel brunnea, maculis atro-violaceis notata, plus minusve compressa vel non compressa, costulis longitudinalibus omnibus bene conspicuis, sat numerosis praedita, per totam superficiem pilis brevibus (sub lente) tecta, apice in collum breve angustata, disco lato pappigero, pappo exteriori vix conspicuo, interiore e pilis facillime deciduis constituto terminata. Calathidia pauciflora (plerumque 5-, raro 6 ad 8-flora), corollae flavae vel roseae. Species montium Asiae Mediae incolae.

Typus subgeneris — *Cicerbita zerauschanica* M. Pop. ex Kovalevsk.
Nomen subgeneris ob colorem achenii datum.

60. LAGOSERIOPSIS Kirp. gen. nov.

Calathidia homogama, pauciflora (4–6-flora), parva, anguste cylindrica vel anguste obconico-cylindrica, apice ramulorum filiformium solitarie disposita. Involutrum plerumque biseriale, oligophyllum. Achenia biformia: exteriora pappo