


Ajuga pyramidalis L., *lusus ramosus*. Alesse, Van d'en haut.

Campanula patula L. Entre Zeneggen et Törbel. 

Globularia Willkommii Nym. var. *elongata* Greml. Viège-Zeneggen.

Plantago major L., var. *intermedia* Gilib. Viège.

Viburnum Opalus L. et **Viburnum Lantana** L. Les deux espèces se trouvent sous forme microphyllé dans les haies bordant le sentier de Morgenruhe sur Zermatt, à 1700 m. C'est probablement leur station la plus élevée.

Galium aparine L., var. *tenerum* Schl. Zeneggen.

Aster Bellidiastrum Scop. var. *orophilus* Briquet. Chaux ronde sur Bretaye, 2000 m.

Erigeron neglectus Kerner, var. *polytrichus* Briquet. Les Filasses sur Anzeindaz.

Erigeron alpinus L. ssp. *polymorphus* Scop. var. *exaltatus* Briquet. Gemmi, versant nord.

Erigeron atticus Vill. Les Nombrieux, Alpes de Bex. Nouveau pour les Alpes vaudoises.

Cicerbita Favrati Wilczek = *C. alpina* × *Plumieri*. Planta inter parentes medium tenens. Inflorescentia laxa glanduloso-hispida, corymboso-racemosa. Pedunculicapitulorum elongati, ± arcuati, inferiori valde distantes, bracteis foliaceis muniti. Planta sub inflorescentia parcepilosa, basi glaucescenti-glabra.

Vernaies du Nant des Ayernes sur les Plans (Vaud). MM. Schinz et Keller, Flora der Schweiz, 3^e éd. Krit. Fl. mentionnent cet hybride avec doute. Je me propose d'étudier l'anatomie des fruits des parents et de l'hybride cet automne.

Je dédie cette plante au souvenir de mon regretté maître et ami L. Favrat.

Gnaphalium Hoppeanum Koch. Les Filasses sur Anzeidaz. Nouveau pour les Alpes vaudoises.

Crepis blattarioides Vill. var. **glabriuscula** Gaudin. Forme peu observée quoique fréquente des stations ombragées. Les Plans, etc.

ADDITION

Primula pubescens Schl. (= *P. Auricula* × *hirsuta*). Col du Jorat sur Salanfe.

Androsace carnea L. Col du Jorat sur Salanfe.

