

Chondrilla cyanoides lutea, coronopl folio non diviso.

Bucc. monf. 2. p. 21. t. 7. Barr. ic. 1135.

Stoebe phytaginifolia. *Alp. exot. 287. t. 286.*

Habitat in Creta. ☉

3. CATANANCHE foliis incisif.

Catananche lutea, foliis varie incisif. *Vaill. atl. 1721.*

græca.

p. 216.

Scorzonera græca saxatilis & maritima, foliis varie laciniatis. *Tournef. cor. 36. itin. 1. p. 223. t. 223.*

Habitat in Græciæ maritimis

CICHORIUM.

1. CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis. *Intybur.*

Fl. succ. 650. Dalib. paris. 244. Mat. med. 373.

Cichorium caule simplici. *Hort. cliff. 389.*

Cichorium sylvestre f. officinarum. *Baub. pin. 126.*

Intybus sylvestris. *Cam. epit. 285. Fuchs. hist. 979.*

Habitat in Europa ad margines agrorum viarumque. ☉

2. CICHORIUM caule simplici, foliis integris crematis. *Endivia.*

Hort. cliff. 389. Hort. nps. 247. Mat. med. 374.

Cichorium latifolium f. Endivia vulgaris. *Baub. pin.*

125.

Intybum fativum. *Dod. pempt. 634.*

3. Endivia crispa. *Baub. pin. 125.*

Habitat - - - ☉

3. CICHORIUM caule dichotomo spinoso. *Hort. cliff. spinosum.*

388.

Cichorium spinosum. *Baub. pin. 126. prod. 62. t. 62.*

Chondrilla genus elegans, caeruleo flore. *Clas. hist. 2.*

p. 145.

Habitat in Creta, Siciliæ collibus arenosis maritimis. ☉

SCOLYMUS.

1. SCOLYMUS foliis margine attenuatis.

maculatum.

Scolymus annuus. *Hort. nps. 241.*

Scolymus. *Hort. cliff. 388.*

Scolymus Chrysanthemus annuus. *Dodart. mem. 4 p.*

323.

Scolymus theophrasti narbonensis. *Clas. hist. 2. p. 153.*

Habitat in G. Narbonensi, Italia. ☉

2. SCOLYMUS foliis margine incrassatis.

hispanicus.

Scolymus vivax. *Sisav. monsp. 294.*

Scolymus Chrysanthemus. *Baub. pin. 384.*

Sco-

824. CATANANCHE. * *Vaill. A. G.* 1721. 56.II. *Catanance Tournef.* 271.

CAL. *Communis* imbricatus, turbinatus: *foliis* plurimis, late incumbentibus, acutis, auctis *squamula* ovato-acuminata, concava, laxa, nitida, persistente.

COR. *Composita* septicida imbricata, uniformis: *Corollulis hermaphroditis* pluribus: *exterioribus* longioribus.

Propria monopetala, ligulata, linearis, calyce longior, truncata, quinque-dentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.

PIST. *Germen* infra receptaculum proprium. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, reflexum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. solitaria, turbinato-ovata, compressa, *coronata* calyculo quinque setarum.

REC. paleaceum.

ONS. *Datur species in qua corolla composita non imbricata est.*

825. CICHORIUM. *Tournef.* 272. *Vaill. A. G.*

1721. 9. 10.

CAL. *Communis* (ante explicationem) cylindræus: *squamis* 2-3 angusto-lanceolatis, æqualibus, cylindrum constituentibus; *quinque* vero incumbentibus, brevioribus.

COR. *Composita* plana, uniformis: *corollulis hermaphroditis* viginti, in orbem positis.

Propria monopetala, ligulata, truncata, profunde quinque-dentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindræo-pentagona, tubulata.

PIST. *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, revoluta.

PER. nullum. *Calyx* cylindræus, apice connivens.

SEM. solitaria, compressa, angulis acutis, *coronata* *Margine* brevi, quinque-dentato.

REC. *paleis* instructum.