

1361. pag. 1624. n. 4. LAPSANA communis. Varietas hirsuta Parisis venit, et in Galiciæ quoque arvis sponte crescit.
1362. ibid. ZACINTHA verrucosa. In definitione citata calyces sessiles dicuntur; in descriptione „flores sessiles“ et ibidem quoque „pedunculi incrassati.“ Sunt omnino flores inflorescentiâ *Cichorei Endiviae* pedunculati: at pedunculi nullo modo incrassati.
1363. pag. 1625. RHAGADIOLUS edulis. Folia hirta. Calyx 5—6 phyllus, foliolis saepe contortis. Semina 5—8 in stellam patentia.
1364. pag. 1628. n. 1. CICHOREUM Intybus. Flores gemini et bigemini ut in Cichoreo divaricato.
1365. pag. 1628. n. 2. CICHORIUM pumilum. Cichorium hocce nomine ex seminibus natum a Do. Kitai-bel missis *Cichorium pumilum* Sp. pl. Willd. l. c. non est: sunt equidem flores axillares sessiles gemini et solitarii: at sunt quoque longe pedunculati. Subjungam descriptionem: radix annua, caulis sesquipedalis villoso-hispidus, villis longis flexuosis. His et pedunculi et calyces vestiuntur, foliaque carina inde et margine ciliata sunt. Folia inferiora obovata, dentata, superiora cordato-lanceolata, amplexicaulia. Flores in apice pedunculi ad basin calycis bracteis stipantur 2 oppositis cordatis ciliatis inter quas foliola 3—4 ve calycem calyculatum efficiunt latiora, inæqualia. Corollæ pauciores in radio, apicibus contractis, subconcavis, cærulecentes. Cum Cichorium pumilum nondum vidisse, et nostrum ab eo tanto-pere discrepat, erit nobis interim nostrum:
CICHORIUM ambiguum, floribus sessilibus axillaribus pedunculatisque, pedunculatis solitariis bracteatis, foliis inferioribus obovatis dentatis, superioribus integris cordatis, amplexicaulibus.
1366. pag. 1629. n. 4. CICHOREUM divaricatum. Caulis magis glaber, folia denticulata, ciliata, pedunculi tenuiores, longiores.
1367. pag. 1630. n. 1. SCOLYMIUS maculatus. Folia nitida.
1368. pag. 1630. n. 2. SCOLYMIUS hispanicus. Flores subinde (*apud nos primo anno floruit*) solitarii. (Folia