

ovato-spathulatis, nervoso-venosis, superne sparse subtus marginaque ciliatis, 2-4-dentatis, caulinis inferioribus obovato-sesilibus, vel breve petiolatis, superioribus linearibus minutissimis; anthodio villoso, squamis lineis 4 longioribus; corollae ligula 5-dentata dente intermedio profundiore, supra flava, subtus ultra medium rubescente. An distincta a *S. rubescens* Tin.? Min. Individuum unicum, ad rupes schistosas maritimas dit. Cala Mezquita. 25 Apr.

* *Cichorium balearicum* n. sp. — Radice fusiformi; caule erecto, sulcato, basi tantum ramoso; foliis radicalibus petiolatis, runcinato-dentatis, obtusis, supra sparse subtus praesertim ad nervum medium setulosis, caulinis minimis, sessilibus, lanceolato-integris; capitulis inferioribus ternis-quaternis, supremis binis, uno vel duo sessilibus, tertio breve altero longe pedicellato, pedicellis longioribus reflexis; involucri squamis exterioribus paleaceis, ovato-obtusis, apice glabris, interioribus duplo longioribus linearibus, apice lanatis; petalis internis languide, exterioribus intense caeruleis. M. In pascuis praedii Plan de Cuba. 31 Jul.

Hyoseris radiata L. var. *pusilla*. — Radice simplici; caule nudo, foliis parum longiore; fol. runcinato-pinnatifidis, lobis ovato-integris, vel ovato-dentatis, in sicco nigrescentibus. Facies *H. scabrae*, ast caules non clavati longioresque. Min. Ad rupes schistosas dit. Cala Mezquita. 25 Apr.

LOBELIACEAE.

Laurentia Michelii DC. — Min. In humidis humosis praedii Binisar-meña prope Mahon. 3 Mai.

BICORNES.

Erica multiflora L. — Min. In pinorum silvulis inter puerto d'Adaja et Fornells. 14 Jul.

* *Monotropa Hypopithys* L. — M. In quercetis supra praedium Mas-sanella. 26 Jun.

ASCLEPIADEAE.

Cynanchum acutum L. — M. In arenosis circa al puerto de Sollèr. 10 Aug.

Vincetoxicum officinale Mch. *β. apodium* Willk. — M. Ad torrentium margines prope Sollèr. 22 Jul.