

O. XI. Cichoraceae. Cichoriengew. 811

rioribus linearibus integerrimis longis. Ibid. *Crepis virgata* Desfont. — *T. altissima* Pers. magis diff. involucro erecto, pappo disci 6setoso. Ibid. *T. virgata* Bertolon. *T. baristata* Bivon. *Crepis ambigua* Balbis *Drepania ambigua* Cand. — *T. coronopifolia* Spreng. longe differt foliis pinnatifidis subcarnosis, involucro erecto. In Canar. Sicil. *Crepis coronopifolia* Desfont. *Crepis succulenta* Ait. *Crepis crithmifolia* m. *Chondrilla hieracioides* Roth.

33. *Zacantha*. *Zacinthe*. *Peranthodium calyculatum*, phylla interiora basi demum maxime gibba. Rec. nudum. Pappus brevissimus scaber. — Hauptkelch umhüllt; innere Blätter an der Basis zuletzt mit einem grossen Höcker. Blütenboden nackt. Federkrone sehr kurz, mit zarten Spitzen. — Gelbe Blumen.

1. *Z. verrucosa* Gaert. Warzige Z. Folia inferiora runcinata, superiora late lanceolata dentata sagittato-amplexicaulia. — Untere Blätter schrotsägenförmig, obere breit lanzettförmig, gezähnt, pfeilförmig stammumfassend. Im südl. Europa. P.

34. *Cichorium*. *Cichorie*. *Peranthodium calyculatum*. Rec. subpaleaceum. Pappus polyphyllus paleaceus. — Hauptkelch umhüllt. Blütenboden mit kleinen Spreublättern. Federkrone vielblättrig, spreuartig. — Blaue Blumen.

1. *C. Intybus* Linn. Gemeine C. Caulis ramis patentibus. Folia inferiora runcinata, superiora lanceolata dentata. Flores axillares 2–3ni, cum pedunculo elongato saepe abortiente. — Stamm mit abstehenden Zweigen. Untere Blätter schrotsägenförmig; d. obere lanzettförmig, gezähnt. Blüten in den Winkeln 2–3, mit einem langen oft abortirenden Blütenstiel. An Wegen durch ganz Europa. P. Wird gebauet. — *C. dichotomum* Schousb. diff. ramis divaricatis. In Eur. aust. P. — *C. spinosum* diff. ramis spinescentibus. Ibid. — *C. Endivia* Linn. *Endivien* C. differt ramis flexuosis foliis minus incisus crispis. Im südl. östlich. Europa? Wird gebauet, und das Kraut als Salat gegessen.