

Hvashaaret Svineöje (4-5) med enblomstrede Rodstilke, Bladene lænseddannede, bugtetandede, hvashaarede.

Paa tørre bjergige Steder i Nærheden af Meqvinez. Dykket i den bot. Have i Khavn blomstrer og bringer den modent Frøe i fri Land. Aarig.

Anmærk. Formedelst Udseendet og det fjærdannede Fnok burde den maaskee snarere forenes med Slægten *Thrin-cie* hos Roth.

Sand Svineöje (8-9) med Frugten ægdannet, stivhaaret, hvas, Frøene i Straalen afvexlende forsynede med Fnok, Stengelen grenet.

Paa sandige Steder i Egnen af Tanger. Blomstrer og bærer Frøe i frie Land i den Bot. Have i Khavn. Aarig.

Udsperret Cikorie (2-3) med Stengelen tvedeelt, Grenene uden Torne, Blomsterne stilk-løse.

Hyoseris hispida (4-5) scapis unifloris; foliis lanceolatis, sinuato-dentatis, hispidis.

In montosis aridis prope Meqvenesiam. In H. bot. Hafn. floret et semina perficit sub dio. Annuæ.

Obs. Ob habitum et pappum plumosum rectius forte cum genere *Thrin-cie* Rothii conjugenda esset.

Hyoseris arenaria (8-9) fructibus ovatis, hispidis, scabris, seminibus radii alternis papposis, caule ramoso.

In arenosis regionis tingitanæ. Floret et fructescit sub dio in H. b. Hafn. Annuæ.

Cichorium divaricatum (2-3) caule dichotomo, ramis muticis, floribus sessilibus.

Paa Markerne i Egnen af Tan- In campis regionis tingitanæ.
ger. Den blomstrer og Frøet Floret seminaqve maturescunt
modnes under aaben Himmel sub dio in H. b. Hafn. An-
i den Bot. Have i Khavn. num.
Aarig.

Langtorner Æselsfoder (3-4) *Onopordon macrocanthum* (3-4)
med Bægeret udspilet, spindel- calycibus squarrosis, arachnoi-
vævagtig-filtet, Skællene vand- deo-tomentosis, squamis hori-
rette, af Bægerets Længde. Tab. zontalibus, longitudine calycis.
V. a. b. Tab. V. a. b.

Hist og her paa Agrene i Pro- Passim in agris provinciæ *Hahæ*.
vindsen *Haha*. Saaet i fri Sub dio sata in H. b. Hafn.
Land i den Bot. Have i floret seminaqve ad maturi-
Khavn blomstrer den og bæ- tatem perveniunt. Annum
rer modent Frøe. Aarig og et Bienne.
toaarig.

Kjöldannet Oxæøje (21-22) *Chrysanthemum carinatum*
med tvefinnede, kjöldfulde, glatte (21-22) foliis bipinnatis, carno-
Blade, Bægerskællene kjöldan- sis, glabris, squamis calycinis
nede. Tab. VI. carinatis. Tab. VI.

I Sandet langs med den Flod, In arenosis secus fluvium, syl-
som løber igjennem Skoven vam prope Mogadore trans-
yed Mogadore. Blomst. mod fluentem. Floret sub exitum
Slutningen af Maj-Maaned. mensis Maii. Sub dio culta
Dyrket under aaben Himmel in H. b. Hafn. semina matu-
i den Bot. Have i Khavn, rat. Annua.

giver den modent Frø. Aarig. Obs. Inter *Leucanthema*
Anmærk. Den burde vel