

2,5 cm. de comprimento, com as bracteas subprateadas, as externas ovadas e as internas lanceoladas com appendice ovado-lanceolado; corollas azuis, as externas muito radiantes; folhas compridas, lineares ou lanceolado-lineares, inteiras ou pennatifendidas, as inferiores pecioladas. Planta de 2-9 dm., ereta, pubescente-assetinada, simples ou ramosa, folhosa na base e nua na parte restante. ♀. Maio-Out. Terrenos sécos e pedregosos: Centro e Sul *Sesamoide menor* * *C. coerulea*, L.

766. **Hispidella**, Barnad. — Capitulos com involucro globoso-ovoide de bracteas 1-seriadas, primeiro herbaceas e depois da anthese endurecidas na base, curvo-conniventes, incluindo os achenios; receptáculo plano, com alveolos profundos, marginados de longas fibras, maiores que os achenios; achenios glabros, obpyramidaes, costados, calvos.

Capitulos solitarios e terminaes, de 2-5 cm. de diametro, com as corollas externas muito radiantes, amarellas, e as internas menores, fusco-purpureas; involucro muito hirsuto; pedunculo dos capitulos mediocre ou curto, na maturação intumescido superiormente; folhas oblongo-lanceoladas ou oblongas, inteiras. Planta de 0,5-2,5 dm., hirsuta, com longos pellos patentes, 1-caule ou multicaule, ereta ou ascendente, simples ou ramosa. ♂. Maio-Jul. Margens dos bosques, sebes, caminhos, arrelvados, logares séccos: Trás-os-Montes, Beira (principalmente na parte montanhosa).

H. hispanica, Lam.

767. — **Cichorium**, L. — Capitulos oblongo-cylindricos com involucro duplo, o externo formado de bracteas mais curtas e o interno de bracteas 1-seriadas, endurecidas na maturação e incluindo os achenios; receptáculo plano, alveolado, mais ou menos fibriloso; corollas azuis, raras vezes rosadas ou brancas; achenios comprimidos, obovados, angulosos, glabros, com papilho curto ou muito curto, escamoso. Hervas caulescentes, folhosas na base e com os ramos subnus; capitulos solitarios ou fasciculados, sesseis ou com pedunculos intumescidos, ôcos.

Planta vivaz, ramosa, de 3-10 dm.; achenios com papilho curtissimo (não superior a 1/4 de mm.), de escamas obtusas e subeguaes; bracteas externas do involucro florifero bastante menores que as internas; folhas superiores ovado-lanceoladas e as basilares roncinadas ou sinuadas. ♀. Jun-Sel. Campos cultivados e incultos, caminhos: Centro e Sul; tambem cult. Almeirão, Chicoria do cafe. *C. Intybus*, L.

Planta glabrescente, com os ramos patentes; involucro glabro ou pelludo-glanduloso. Frequentemente *a. glabratum* (Presl.), Gr. et Godr.

Planta villosa, com os ramos erecto-patentes; involucro pelludo no cimo, com os pellos não ou pouco glandulosos. Muito menos frequente que *a.*

. *b. leucophaeum*, Gr. et Godr.

Planta annual ou biennal; achenios com papilho curto (0,5-1 mm.), de escamas agudas e deseguaes; bracteas do involucro florifero célfheadas, as externas pouco menores que as internas; folhas superiores cordiforme-ovadas. ♂. ou ♀. Marco.-Agosto. *C. Endivia*, L.

Planta glaucescente, mais ou menos pelluda inferiormente, de 1-10 dm., muito ramosa com os ramos divaricados; folhas inferiores roncinadas ou sinuadas, planas. Terrenos sécos, campos de pousio, caminhos: Beira merid., Estrem., Alem. e Alg. . *Chicoria brava*. *a. pumilum* (Jacq.).

Planta verde ou verde-amarellada, glabra, com os ramos erecto-patentes; folhas inferiores laciniado-crespas ou onduladas. Cult.

. *Chicoria, Escarola, Endivia*. *b. sativum*.

768. **Lapsana**, L. — Capitulos com involucro cylindrico-campanulado de bracteas erectas, 1-seriadas, lanceolado-lineares, provido na base de bracteas muito pequenas, caliculiformes, ovadas e applicadas; receptáculo nu; achenios aclavados-fusiformes, comprimidos, estriados, rectos ou curvos, calvos.