

subcompressa striata glabra. Pappus squamellis brevissimis obtusiusculis numerosis 1-2-seriatis constans. — Herbæ Gerontogæ erectæ ramosæ. Folia radic. oblonga dentata aut runcinata. Capitula aut ad axillas fol. sup. sessilia, aut ramulos terminantia. Cor. lætè cœruleæ. Herbæ amaræ, culturâ mansuetæ edules.

Sect. I. EUCICHIORIUM, — *Cichorium Less. syn. 129.*

Capitula multiflora.

1. C. INTYBUS (Linn. sp. 1142), foliis infer. runcinatis ad carinam hispido-scabris, super. oblongis subintegris, capitulis axillaribus 2-3 sessilibus.  $\frac{1}{2}$  ad margines viarum et agrorum Europæ ferè totius. Engl. bot. t. 538. Heyn. arnz. gew. 2. t. 24. Blackw. herb. t. 183. Variat floribus roseis albisve aut sæpiissimè cœruleis; caule sæpè fasciato; foliis plus minus hispidis et ramulis 1-cephalis ad basin capitulorum fasciculorum sæpius inferiorum exsertis (conf. fl. dan. t. 907), quod etiam in plantâ cultâ occurrit (Blackw. herb. t. 177.) Hujus videtur mera var. C. Cicorea Dumort. fl. belg. prod. 64. (v. v.)
- β. *divaricatum*, capitulis 2-3 sessilibus et ramulo apice subincrassato 1-cephalo ex axillis fol. superiorum ortis. — in Europâ occidentali et australi, in Zacintho (Marg.), Hispaniâ austr. (Boiss.), necnon in Maderâ Lowe!), Barbariâ (Schousb.), Ægypto (Coqueb.). Monente cl. Bastard nullum video descrimen inter stirpes Europæas et Mauritanicas. (v. v. et s.)
2. C. ENDIVIA (Willd. sp. 3. p. 1629), caule laevi hinc indè piloso, foliis infer. oblongis sinuatis dentatisve glabriusculis, floralibus basi auriculato-dilatatis. (2) I Huc duæ var. priori speciei analogæ referendæ videntur :
  - a. *Cosnia*, foliis oblongis sinnatis aut subpinnatifidis scabridis, capitulis axillaribus pluribus congestis sessilibus. — in Indiâ orient. ad Patna, Gandoyari, Bakhira, in Kamaon, Nepaliâ. C. Cosnia Ham. in Wall. cat. comp. n. 351. C. Endivia herb. Madr. vix indigena herb. Wight! videtur omnino stirps C. Endiviæ sylvestris (v. s.)
  - β. *sativa*, foliis glabris oblongis denticulatis, capitulis ad axillas foliorum super. 2-4 sessilibus aggregatis et ramulo elongato 1-cephalo. (1) (2) culta in hortis Europæ. C. Endivia Linn. sp. 1142. et omn. auctorum. Blackw. herb. t. 378. Variat foliis laceris et crispis, flore cœruleo et albo. (v. v.)
3. C. RUMIUM (Jacq. obs. 4. p. 3. t. 80), foliis obovatis dentatis caulinisque inferè scabridis, capitulis axillaribus geminis sessilibus. (1) patr. ign. An forte C. Intybus var.? An satis differt C. ambiguum Schult. obs. p. 170?
4. C. GLABRATUM (Presl fl. sic. 1. p. xxxii), caule . . . . ., foliis radicalibus runcinatis glabris in costâ sebris, caulinis minimis, capitulis geminis, uno longè pedunculato, altero sessili, invol. exterioris squamis ovatis acutis subciliatis interiore duplò brevioribus. — in Siciliâ. An adhuc C. Endiviæ var.?

Sect. II. ACANTHOPHYTON. — *Acanthophyton Less. syn. 125.*

Capitula sexflora.

5. C. SPINOSUM (Linn. sp. 1142), caule indurato dichotomo, ramis demùm apice pungentibus, capitulis aliis ad axillas sessilibus subgeminis, aliis terminalibus solitariis. (2) Less. (1) Linn. in ins. Cretâ (Sibth. Oliv.!), Astypalæâ (d'Urv.!), Cypro (Auch.!), in Græciâ propè Athenas (herb. ac. Mon.!) et Corinthum (Parol.!), in Siciliâ merid. (Guss.!), ad littora aprica sicca et arenosa. — C. Bauh. prod. t. 62. (v. s.)

+ *Species exclusa.*

C. ALATUM H. et St. — *Diplostemma alatum.*