

non latè auriculatis sed decurrentibus, spinis appendicum inæqualibus nec subæqualibus, flosculis pallidioribus neutris minùs longè radiantibus, etc.

CICHORACEÆ

CICHORIUM GLANDULOSUM Boiss. et Huet.

C. annuum caule erecto subangulato-striato infernè albo nitido glabro supernè plùs minùsve dichotomè ramoso pilis patulis tenuissimis apice glandulosis ut et rami pedunculique obsito, foliis radicalibus.... caulinis e basi sessili obtusè subauriculatâ oblongo-lanceolatis acutis denticulis acutis apice subspinulosis obsitis pallidè virentibus utrinque pilis albis papillaribus scabridis, floralibus ad pedunculorum capitulorumque basin oblongo-lanceolatis acutis rigidis, pedunculis a basi sursùm incrassatis longitudine variis, capitulis 10-12 floris aliis ad apicem pedunculorum solitariis aliis in dichotomiis et ad ramorum partem superiorem sessilibus, involucri pilis glandulosis obsiti squamis basi induratis externis subbrevioribus oblongis acutis apice spinescentibus, internis biserialibus basi glabratis lanceolatis apice subincurvo obtusis serie interiori angustiori, receptaculo medium versùm squamuloso, acheniis rufescentibus nigro-maculatis angulatis tenuissimè sublente rugulosis externis subcompressis coronâ roseâ eis sextuplò breviori paleis subbiserialibus lineari-spathulatis rigidis inter se contiguis constanti superatis.

Hab. in ruderatis circa *Erzeroum* cl. Huet du Pavillon, circâ *Diarbekir* Mesopotamiæ Kotschy 1843 N° 138.

Species habitu *C. divaricatum* Schousb. et ejus formas *C. pumilum* et *C. minimum* referens. Omnes a nostrâ specie differunt indumenti glandulosi defectu, involucri squamis interioribus exteriores triplò superantibus longè lineari-attenuatis. *C. intybus* radice perenni aliisque notis longiùs differt.

LEONTODON PAVONII Boiss. (Sect. *Apargia*.)

L. perenne radice simplici verticali elongatâ nigrâ, foliis omnibus radicalibus rosulatis lineari-lanceolatis irregulariter pinna-