

Armeniæ ad Erzerum in neglectis (Huet!), Syriæ borealis et Mesopotamiae ad Nisib, Aintab, Orfa (Haussk!), ad Diarbekir (Ky. 183!).

Semipedale et pedale, a *C. divaricato* phyllis glanduloso-asperis, externis eis hujus specie multo angustioribus sed acutis et interiora subæquantibus, corollis brevibus egregie distinctum.

4. **C. Noëanum**, annuum, caule glabro rigidulo parce et dichotome ramoso, foliis radicalibus in lacinias triangulares runcinatum pinnatipartitis margine et saepe ad costam minute calcareo-spinulosis, superioribus a basi semiamplexicauli anguste linearibus, capitulis dichotomiarum fasciculatis sessilibus altero longe pedunculato, terminalibus longe pedunculatis pedunculis demum incrassatis, involueri phyllis breviter lanceolatis acutis glabris remote spinuloso-ciliatis externis vix brevioribus, flosculis involucro vix duplo brevioribus, pappi paleis breviter linearispathulatis achenio quintuplo brevioribus, acheniorum interiorum alternatim in aristam achenio subæquilongam productis ⊖.

Hab. in cultis et ruderatis Babyloniæ prope Kutt ad Tigrim (Noë exs. 53!).

Facie, phyllorum involueri formâ, corollis parvis *C. glanduloso* affine sed glabrum, capitulorum dichotomialium alterum pedunculatum, pappi paleæ interiores in setas productæ. Ulterius observandum.

### § 2. **Acanthophyton** D.C. — Capitula quinqueflora, rami spinescentes.

5. **C. spinosum** (L. Sp. 4142) perenne vel biennne, rhizomate pluricipiti cespitoso, caulibus nanis crassis a basi dichotome et divaricatum ramosissimis ramis terminalibus saepius non floriferis accretis spinescentibus persistentibus, foliis carnosulis rosulatis sinuato-dentatis vel runcinatum pinnatifido-lyratis segmentis parvis obtusis terminali majore ovato vel oblongo, capitulis in dichotomiis subsessilibus solitariis rarius 2-3 aggregatis, terminalibus paucis pedunculatis, involueri phyllis obtusis externis breviter ovatis mucronulatis internis triplo longioribus linearibus, flosculis involucro duplo longioribus, pappo setoso-subpaleaceo achenio 8-10-plo breviore ♂. Ic. Fl. Græc. tab. 823. — Rchb. Ic. tab. 6.

Hab. in saxosis et arenosis maritimis Laconia (Fl. Pélop.), Atticæ inter Eleusin et Megaram et ad Calamaki prope Corinthum (Boiss!, Sprun!), Cephallenia (Schimp!), Cretæ (Sibth., Heldr! Raul!), Rhodi (Bourg!), Cypræ (Sibth., Auch. 3454!).

**Ar. Geogr.** Insulæ Baleares, Sicilia.

### HYOSERIS (L. Gen. 916 ex parte).

Capitulum multiflorum. Receptaculum nudum. Involucrum calyculatum squamis calyculi 1-vel biserialibus, phyllis 6-10 fructiferis induratis achenia externa fulcrantibus. Achenia externa a dorso compressa linearia breviter apice setulosa, intermedia compresso-alata