

почти прикорневые, 1—4 см дл., длинночерешковые, в очертании узколанцетные, перисторассеченные или перистолопастные, реже отчасти цельные. Корзинки в числе (1)2—10 на стеблях. Обертки 7—8 мм дл., узкоколокольчатые, темно-зеленые; наружные листочки обертки в числе 3—6, в 4—6 раз короче внутренних. Цветки желтые. Незрелые семянки на верхушке суженные, с паппусом 6—7 мм дл.

Турус (тип): «Tibet, jugum Burchan-Budda, declivitas septentrionalis, faux Chatu, 12—14 500 ft., falveus lapidosus siccus rivuli Chatu-gol, 12 VII 1901, N 248, V. F. Ladygin» (LE).

Paratypi (паратипы): «Тибет, левый берег р. Ды-Чю, 4300—5000 м, 2 VI 1884, Н. М. Пржевальский»; «долина р. Хуанхэ, 26 VII—7 VIII 1884, он же»; «хр. Пржевальского, сев. склон, 4700 м, на песке, 20 VIII 1890, В. И. Роборовский»; «Нань-Шань, р. Шарагольджин, уроч. Кай-Чунг, на песке у реки, 4000 м, 12 VI 1894, N 327, В. И. Роборовский»; «оз. Куку-нор, песчаный берег, 4000 м, 20 VIII 1908, N 689, С. С. Четыркин» (LE).

Affinitas (родство). *A. speciebus proximis* — *A. lactea* (Lipsch.) W. Weber et *A. minuta* (Kitag.) Tzvel. Foliis multo angustioribus, pinnatifidis vel pinnatilobatis; rarius partim integris differt. — От наиболее близких видов *A. lactea* и *A. minuta* отличается более узкими, перистораздельными или перистолопастными, реже отчасти цельными листьями.

Вид назван в память одного из его коллекторов В. Ф. Ладыгина, выдающегося исследователя Центральной Азии.

Askellia melanthera (An) Tzvel. comb. nov. — *Crepis melanthera* An, 1999, in Fl. Xinjiang. 5 : 481, 463.

Экземпляров этого вида, описанного из окр. г. Урумчи (тип.: «Urumgi Shi, Zhag Yan-fu 82-0844, alt. 800 m, 2 VIII 1982» ХЛМИ), мы не видели.

Crepidifolium Sennik. gen. nov. — *Geblera* Kitag. 1937, Journ. Jap. Bot. 13 : 433, non Fisch. et C. A. Mey., 1835; Andrz. ex Bess. 1934, Flora (Regensb.) 17, Beibl. 1 : 18, nom. illeg. — *Youngia* sect. *Crepidopsis* Babc. et Stebb. 1937, Carnegie Inst. Wash. Publ. 484 : 25. nom. inval. — Plantae perennes, caulinibus vulgo divaricatis, caudice ligneo. Folia rosularia pinnata, runcinata vel linearis spathulata, glabra vel subglabra. Calathidia 5—15—flora. Involucrum biserialis. Achenia cylindrica, costis 10. Pappus facile deciduus. — Турус: **C. tenuifolium** (Willd.) Sennik. comb. nov. (= *Crepis tenuifolia* Willd. 1803, Sp. Pl., ed. 3 : 1606. — А. Н. Сенников приводит здесь лишь очень краткий диагноз описываемого им нового рода и новую комбинацию для его типового вида. Более полный диагноз и обоснование для его выделения будут даны им позднее в журнале «Komarovia»).

Crepidifolium altaicum (Babc. et Stebb.) Tzvel. comb. nov. — *Youngia tenuifolia* subsp. *altaica* Babc. et Stebb. 1937, l. c.: 50. — *Y. altaica* (Babc. et Stebb.) Czer. 1964, l. c.: 384.

Crepidifolium diversifolium (Ledeb. ex Spreng.) Tzvel. comb. nov. — *Prenanthes diversifolia* Ledeb. ex Spreng. 1826, Syst. Veg. 3 : 657. — *Youngia diversifolia* (Ledeb. ex Spreng.) Ledeb. 1846, Fl. Ross. 2, 2 : 837; Чер. 1964. цит. соч.: 380.

Crepidifolium tenuicaule (Babc. et Stebb.) Tzvel. comb. nov. — *Youngia tenuifolia* subsp. *tenuicaulis* Babc. et Stebb. 1937, l. c.: 52. — *Y. tenuicaulis* (Babc. et Stebb.) Czer. 1964, l. c.: 385. — *Crepidiastrum tenuicaule* (Babc. et Stebb.) Sennik. 1977, Бот. журн. 82, 5 : 115.